

En Haïti, comme dans la plupart des pays de l'Amérique Latine et des Caraïbes, la transmission du sida se fait principalement par voie sexuelle. Les hommes et les femmes interrogés lors de l'EMMUS-IV, en majorité sexuellement actifs, sont donc concernés au premier plan par les campagnes d'Information, d'Éducation et Communication (IEC) lancées à travers le pays par le Programme National de Lutte contre le Sida. Dans le but d'évaluer l'impact du programme réalisé en Haïti, des questions ont été posées sur la connaissance, les attitudes et les pratiques concernant les IST et le sida en particulier, ainsi que sur les comportements sexuels. Les informations ainsi collectées sont essentielles à l'ajustement des programmes en cours, ainsi qu'à la mise en place de nouvelles campagnes d'information, d'éducation et de communication sur le sida.

Les résultats présentés ici concernent principalement les points suivants :

- la connaissance de l'existence du VIH/sida, des moyens de prévention, de ses modes de transmission ainsi que la croyance en des idées erronées sur la transmission et la prévention de l'infection ;
- la connaissance de la transmission du virus du VIH de la mère à l'enfant ;
- les attitudes et comportements à l'égard des personnes vivant avec le VIH/sida ;
- les rapports sexuels à hauts risques et l'utilisation des condoms lors des derniers rapports sexuels à hauts risques ;
- l'âge des adolescents (15-24 ans) aux premiers rapports sexuels ;
- les rapports sexuels à hauts risques et l'utilisation des condoms lors des derniers rapports sexuels à hauts risques chez les adolescents de 15-24 ans ;
- les rapports sexuels pré-nuptiaux parmi les jeunes de 15-24 ans et l'utilisation d'un condom ;
- la connaissance des autres IST et de leurs symptômes ;
- la recherche de traitement pour les IST ; et
- la prévalence des injections.

En outre, lors de l'EMMUS-IV, un test de séroprévalence du VIH dans la population générale masculine et féminine a été effectué. Les résultats sont présentés au chapitre 15.

14.1 CONNAISSANCE DU VIH/SIDA, DES MOYENS DE PRÉVENTION ET DE TRANSMISSION

14.1.1 Connaissance du VIH/sida et de l'existence de moyens de prévention

L'attitude et le comportement que les populations ont vis-à-vis du VIH/sida sont largement tributaires de leur niveau de connaissance de la maladie. Ainsi, l'EMMUS-IV a cherché à évaluer les niveaux de connaissance du VIH/sida et de ses modes de transmission ainsi que la connaissance des moyens de prévention de l'infection dans la population générale.

Pour évaluer le niveau de connaissance de cette infection par les femmes et les hommes, on leur a demandé s'ils connaissaient cette maladie ou s'ils en avaient déjà entendu parler. Les résultats présentés au tableau 14.1 révèlent que le niveau de connaissance du VIH/sida est très élevé en Haïti : 99 % parmi les femmes et 100 % parmi les hommes (contre respectivement 97 % et 98 % à l'EMMUS-III de 2000). Quels que soient l'âge, l'état matrimonial, le milieu de résidence et le niveau d'instruction, le niveau de connaissance est élevé aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

14.1.2 Connaissance des moyens de prévention du VIH/sida

La connaissance des moyens de prévention appropriés est essentielle pour se protéger de l'infection. La limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté ainsi que l'utilisation du condom demeurent les principaux moyens de prévention de l'infection à VIH. Au cours de l'EMMUS-IV, on a demandé aux enquêtés s'ils savaient qu'on pouvait réduire les risques de contracter le virus en utilisant ces deux moyens. Les résultats selon différentes caractéristiques socio-démographiques sont présentés au tableau 14.2. Plus de huit personnes sur dix (81 % des femmes et 90 % des hommes) savent que le recours à ces deux moyens permet de réduire les risques de contracter le VIH/sida. De ces deux moyens, la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté a été le plus fréquemment citée : 93 % des femmes et 95 % des hommes contre respectivement, 84 % et 92 % pour l'utilisation du condom. On relève également que ces deux moyens de prévention sont plus connus par ceux/elles qui résident dans le département du Sud (89 % pour les femmes et 96 % pour les hommes), les femmes en union (82 %) et les hommes célibataires ayant déjà eu des rapports sexuels (92 %), ainsi que par les femmes et les hommes de niveau secondaire ou plus (respectivement 84 % et 90 %).

Tableau 14.1 Connaissance du sida

Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15-49 ans qui ont entendu parler du sida, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Femmes		Hommes	
	Entendu parler du sida	Effectif	Entendu parler du sida	Effectif
Groupe d'âges				
15-19	98,6	2 701	99,1	1 211
20-24	99,6	2 004	99,3	893
25-29	99,6	1 761	100,0	597
30-39	99,7	2 412	99,9	969
40-49	99,5	1 879	99,8	768
15-24	99,0	4 704	99,2	2 104
État matrimonial				
Célibataire	98,6	3 454	99,3	2 325
A déjà eu des rapports sexuels	99,8	1 327	99,8	1 766
N'a jamais eu de rapports sexuels	97,9	2 128	97,5	559
En union	99,7	6 323	99,9	1 894
Divorcé/séparé/veuf	99,6	980	100,0	218
Milieu de résidence				
Aire Métropolitaine	100,0	2 773	100,0	1 016
Autres Villes	99,7	2 232	99,8	865
Ensemble urbain	99,9	5 005	99,9	1 881
Rural	98,9	5 752	99,3	2 556
Département				
Aire Métropolitaine	100,0	2 773	100,0	1 016
Ouest (sans Aire Métro.)	99,7	1 808	99,3	758
Sud-Est	99,2	487	97,4	227
Nord	99,0	1 036	99,6	385
Nord-Est	99,6	339	99,7	146
Artibonite	98,4	1 654	100,0	754
Centre	98,4	811	98,2	331
Sud	99,9	669	100,0	299
Grande-Anse	99,3	355	100,0	179
Nord-Ouest	99,2	593	99,8	233
Nippes	99,0	232	100,0	109
Niveau d'instruction				
Aucun	98,9	2 169	99,5	566
Primaire/alphab.	99,0	4 553	99,2	1 860
Secondaire +	100,0	4 034	99,9	2 012
Quintile de bien-être économique				
Le plus pauvre	97,6	1 656	98,9	719
Second	99,1	1 762	99,4	839
Moyen	99,6	1 985	99,4	831
Quatrième	99,9	2 539	99,9	943
Le plus riche	99,9	2 814	100,0	1 105
Ensemble 15-49	99,4	10 757	99,6	4 438
Ensemble hommes 15-59	na	na	99,6	4 958

na = Non applicable

Tableau 14.2 Connaissance des moyens de prévention du VIH/sida

Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15-49 ans qui, en réponse à une question déterminée, déclarent qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Femmes					Hommes				
	Utilisant des condoms	Limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté	Utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire non infecté	S'abstenant de rapports sexuels	Effectif de femmes	Utilisant des condoms	Limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté	Utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire non infecté	S'abstenant de rapports sexuels	Effectif d'hommes
Groupe d'âges										
15-19	83,0	91,1	78,8	82,8	2 701	91,9	95,4	90,1	85,9	1 211
20-24	86,5	94,0	83,4	84,9	2 004	90,9	92,9	87,4	86,2	893
25-29	84,8	94,1	81,4	83,4	1 761	93,5	96,7	91,0	87,2	597
30-39	84,7	93,9	82,1	86,6	2 412	94,1	95,4	91,2	89,0	969
40-49	81,5	93,2	78,2	83,4	1 879	89,6	96,7	88,1	89,4	768
15-24	84,5	92,4	80,8	83,7	4 704	91,5	94,3	89,0	86,0	2 104
État matrimonial										
Célibataire	82,1	91,1	78,0	83,1	3 454	91,6	94,5	89,1	86,6	2 325
A déjà eu des rapports sexuels	84,5	91,1	79,5	83,6	1 327	93,6	95,7	91,5	87,2	1 766
N'a jamais eu de rapports sexuels	80,6	91,0	77,1	82,7	2 128	85,3	90,8	81,4	84,6	559
En union	85,2	94,1	82,1	85,1	6 323	92,4	95,9	90,0	88,4	1 894
Divorcé/séparé/veuf	83,6	94,2	81,4	82,7	980	92,6	97,7	91,1	87,6	218
Milieu de résidence										
Aire Métropolitaine	84,1	94,1	81,3	83,0	2 773	90,6	93,8	87,5	85,0	1 016
Autres Villes	86,6	94,3	83,6	85,8	2 232	92,0	95,5	89,1	86,2	865
Ensemble urbain	85,2	94,2	82,3	84,3	5 005	91,3	94,6	88,3	85,6	1 881
Rural	83,0	92,2	79,3	84,2	5 752	92,5	95,8	90,5	88,8	2 556
Département										
Aire Métropolitaine	84,1	94,1	81,3	83,0	2 773	90,6	93,8	87,5	85,0	1 016
Ouest (sans Aire Métro.)	84,1	93,0	80,9	82,4	1 808	92,5	96,2	91,5	88,7	758
Sud-Est	84,4	94,0	82,5	87,8	487	90,9	93,9	88,7	88,0	227
Nord	82,8	94,4	81,0	85,8	1 036	92,2	96,7	89,8	89,6	385
Nord-Est	86,3	95,0	84,2	88,9	339	94,8	97,3	93,5	90,2	146
Artibonite	79,9	91,5	75,6	81,5	1 654	89,1	92,5	84,6	81,1	754
Centre	82,7	92,3	79,3	84,6	811	91,5	94,5	88,8	88,1	331
Sud	93,6	94,7	89,3	91,5	669	96,0	99,7	96,0	93,4	299
Grande-Anse	87,3	86,5	77,6	87,0	355	95,5	98,5	94,2	94,3	179
Nord-Ouest	83,2	92,8	79,4	82,9	593	95,7	96,8	93,1	90,9	233
Nippes	89,0	93,7	87,4	88,7	232	95,4	99,2	94,7	94,0	109
Niveau d'instruction										
Aucun	78,8	91,2	75,3	82,8	2 169	89,0	93,9	86,3	88,9	566
Primaire/alphab.	84,3	92,2	80,5	85,0	4 553	92,3	95,5	90,1	88,9	1 860
Secondaire +	86,6	95,2	83,8	84,2	4 034	92,5	95,5	90,0	85,6	2 012
Quintile de bien-être économique										
Le plus pauvre	80,3	89,6	76,6	82,6	1 656	89,3	95,9	87,6	87,9	719
Second	83,4	93,3	80,4	85,1	1 762	92,3	96,0	90,1	90,9	839
Moyen	84,9	93,4	80,5	86,9	1 985	94,1	94,5	91,1	88,6	831
Quatrième	86,6	94,8	84,1	84,7	2 539	92,6	95,0	89,9	86,7	943
Le plus riche	83,8	93,4	80,4	82,5	2 814	91,5	95,2	89,0	84,1	1 105
Ensemble 15-49	84,1	93,1	80,7	84,2	10 757	92,0	95,3	89,6	87,4	4 438
Ensemble hommes 15-59	na	na	na	na	na	91,1	95,2	88,7	87,3	4 958

na = Non applicable

14.1.3 Connaissance correcte de la transmission du VIH/sida et rejet d'idées erronées

Au cours de l'enquête, une série de propositions ont été soumises aux enquêtés pour mesurer leur niveau de connaissance correcte concernant la transmission et la prévention du VIH/sida. Les résultats sont présentés aux tableaux 14.3.1 pour les femmes et 14.3.2 pour les hommes.

À la question « Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait, en fait, contracté le virus du sida ? », 83 % des femmes et 90 % des hommes ont répondu affirmativement. Cette connaissance est cependant très variable selon les caractéristiques sociodémographiques.

La proportion de femmes ayant donné une réponse affirmative varie d'un minimum de 70 % chez celles du quintile le plus pauvre à un maximum de 92 % chez celles du quintile le plus riche ou chez celles ayant un niveau d'instruction au moins secondaire (tableau 14.3.1). Par ailleurs, on constate qu'en milieu urbain, les femmes ont été plus nombreuses qu'en milieu rural à connaître cet aspect du VIH (respectivement, 90 % contre 78 %). L'analyse selon le département de résidence laisse apparaître aussi des écarts : c'est dans les départements des Nippes (86 %) et du Sud (85 %) que les proportions de femmes ayant répondu affirmativement à cette question sont les plus élevées ; en revanche, dans les départements du Centre et du Nord (76 % dans les deux cas), les proportions sont plus faibles.

À la question de savoir si le virus du sida pouvait se transmettre par les moustiques, seulement une femme sur deux (50 %) a répondu par la négative. On note que les femmes du milieu rural (42 % contre 60 % en zone urbaine), les femmes de 40-49 ans (44 % contre 53 % à 15-19 ans) et celles vivant dans un ménage du quintile le plus pauvre (37 % contre 67 % dans le plus riche) sont celles qui ont le moins fréquemment déclaré que le sida ne pouvait pas se transmettre par les moustiques. De même, on observe des écarts très importants en fonction du niveau d'instruction. En effet, seulement 40 % des femmes sans instruction sont bien informées, contre 42 % des femmes de niveau primaire et 66 % de celles de niveau secondaire ou plus. En outre, des différences interdépartementales notables sont également observées. C'est dans le département du Centre (41 %) que les pourcentages de femmes possédant l'information correcte sont les plus faibles.

À la question de savoir si on peut contracter le virus du sida par sorcellerie ou par des moyens surnaturels, les résultats montrent que près de sept femmes sur dix (68 %) ont répondu correctement à cette question. Cependant, ces proportions sont plus faibles parmi les femmes les plus âgées (61 %), celles du milieu rural (65 %), celles sans instruction (58 %) et celles des ménages les plus pauvres (60 %). En fonction du département, on constate que ce sont les femmes de l'Artibonite (59 %) qui rejettent le moins fréquemment cette idée erronée.

En ce qui concerne la quatrième question, on constate que dans 73 % des cas, les femmes ont répondu de manière correcte. En milieu rural, et parmi les femmes sans instruction, ces proportions ne sont que de respectivement 65 % et 57 %. On constate également de grandes différences interdépartementales. C'est dans le Centre (63 %), l'Artibonite (64 %) et le Sud-Est (66 %) que les proportions de femmes ayant répondu de manière correcte sont les plus faibles.

Globalement, on constate que seulement 37 % des femmes rejettent les deux idées erronées locales les plus courantes et savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le virus du sida. Ce pourcentage varie peu avec l'âge ; cependant, on note que ce sont les femmes de 40-49 ans qui sont les moins bien informées (29 % contre 40 % à 25-29 ans). Cette proportion de femmes qui disposent des informations correctes est plus élevée parmi celles du milieu urbain (46 %), en particulier dans l'Aire Métropolitaine (51 %), parmi les plus instruites et parmi celles du quintile le plus riche (53 % dans les deux cas). Dans les départements, ce pourcentage varie d'un minimum de 29 % au Centre et en Artibonite à un maximum de 37 % au Sud et dans les Nippes.

Tableau 14.3.1 Idées erronées à propos du sida : femmes

Pourcentage de femmes qui, en réponse à une question déterminée, rejettent des idées locales erronées les plus courantes à propos de la transmission ou de la prévention du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV 2005-2006

Caractéristique	Pourcentage de femmes qui savent que :				Pourcentage rejetant les 2 idées erronées les plus courantes ¹ et sachant qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le sida	Pourcentage ayant une connaissance complète du sida ²	Effectif de femmes
	Une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida	Le sida ne peut pas être transmis par les moustiques	Le sida ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels	Une personne ne peut pas être infectée en partageant les repas d'un malade du sida			
Groupe d'âges							
15-19	77,8	52,9	67,6	70,0	36,3	30,9	2 701
20-24	85,9	50,7	72,3	77,5	37,8	33,2	2 004
25-29	88,1	51,6	73,1	79,8	39,7	34,3	1 761
30-39	85,3	51,2	67,8	72,5	39,0	34,3	2 412
40-49	81,9	44,3	61,3	66,3	29,2	25,3	1 879
15-24	81,2	52,0	69,6	73,2	37,0	31,9	4 704
État matrimonial							
Célibataire	81,5	55,5	71,0	75,8	40,6	33,9	3 454
A déjà eu des rapports sexuels	86,9	57,1	71,5	81,2	43,1	36,4	1 327
N'a jamais eu de rapports sexuels	78,1	54,5	70,6	72,4	39,0	32,3	2 128
En union	83,9	47,8	67,6	71,3	34,7	30,7	6 323
Divorcée/séparée/veuve	86,9	48,9	63,8	73,2	33,5	29,7	980
Milieu de résidence							
Aire Métropolitaine	92,3	64,3	74,8	84,9	50,8	42,6	2 773
Autres Villes	87,3	54,0	68,4	78,3	40,1	35,5	2 232
Ensemble urbain	90,1	59,7	72,0	81,9	46,0	39,4	5 005
Rural	77,5	42,3	65,2	65,0	28,2	24,9	5 752
Département							
Aire Métropolitaine	92,3	64,3	74,8	84,9	50,8	42,6	2 773
Ouest (sans Aire Métro.)	85,6	45,6	66,4	71,7	32,4	28,8	1 808
Sud-Est	76,7	43,7	65,0	66,0	30,4	28,5	487
Nord	76,0	46,2	64,0	68,5	29,7	27,3	1 036
Nord-Est	84,4	44,4	69,8	73,2	34,8	32,1	339
Artibonite	77,5	45,6	59,2	64,4	28,8	24,1	1 654
Centre	75,5	40,5	69,2	62,8	28,6	23,6	811
Sud	85,0	50,7	69,3	72,8	37,0	33,7	669
Grande-Anse	82,4	46,3	74,1	69,6	36,2	31,4	355
Nord-Ouest	77,8	46,0	72,0	74,2	31,5	27,7	593
Nippes	85,5	47,9	72,2	70,2	37,4	35,3	232
Niveau d'instruction							
Aucun	74,9	39,5	58,0	56,9	23,5	20,5	2 169
Primaire/alphab.	79,5	42,1	63,4	65,8	27,8	24,6	4 553
Secondaire +	92,3	65,6	79,5	89,5	53,3	45,7	4 034
Quintile de bien-être économique							
Le plus pauvre	70,4	36,7	60,2	52,2	20,0	17,0	1 656
Second	75,0	41,2	65,1	63,1	27,4	24,9	1 762
Moyen	82,2	41,2	65,7	69,1	28,9	25,8	1 985
Quatrième	89,2	54,6	68,9	80,0	40,8	35,8	2 539
Le plus riche	91,8	66,8	76,6	87,4	53,4	44,9	2 814
Ensemble 15-49	83,4	50,4	68,3	72,9	36,5	31,7	10 757

¹ Les deux idées erronées locales les plus courantes sont la transmission par les piqûres de moustiques et le fait de partager les repas avec une personne infectée.

² Sont considérés comme ayant une connaissance « complète », les femmes qui déclarent qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté, qui rejettent les idées locales erronées les plus courantes à propos de la transmission du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida.

Tableau 14.3.2 Idées erronées à propos du sida : hommes

Pourcentage d'hommes qui, en réponse à une question déterminée, rejettent les idées locales erronées les plus courantes à propos de la transmission ou de la prévention du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Pourcentage d'hommes qui savent que :				Une personne ne peut pas être infectée en partageant les repas d'un malade du sida	Pourcentage rejetant les 2 idées erronées les plus courantes ¹ et sachant qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le sida	Pourcentage ayant une connaissance complète du sida ²	Effectif d'hommes
	Une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida	Le sida ne peut pas être transmis par les moustiques	Le sida ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels	Le sida ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels				
Groupe d'âges								
15-19	85,9	52,2	76,3	68,3	37,1	34,2	1 211	
20-24	92,6	65,0	83,0	84,4	54,7	48,7	893	
25-29	92,3	62,3	82,2	83,3	52,2	49,5	597	
30-39	90,1	62,0	77,3	77,0	48,8	45,2	969	
40-49	90,1	49,9	68,0	72,4	35,7	33,2	768	
15-24	88,7	57,6	79,1	75,1	44,6	40,4	2 104	
État matrimonial								
Célibataire	88,2	58,1	79,0	75,0	45,1	41,5	2 325	
A déjà eu des rapports sexuels	92,2	60,2	80,9	78,7	48,8	44,8	1 766	
N'a jamais eu de rapports sexuels	75,8	51,7	73,0	63,3	33,4	30,9	559	
En union	91,5	57,5	74,8	77,4	44,9	41,4	1 894	
Divorcé/séparé/veuf	90,2	58,5	79,8	77,6	45,0	41,0	218	
Milieu de résidence								
Aire Métropolitaine	97,6	74,3	82,7	81,6	63,2	56,7	1 016	
Autres Villes	92,8	59,5	82,8	81,9	51,1	46,8	865	
Ensemble urbain	95,4	67,5	82,8	81,7	57,6	52,2	1 881	
Rural	85,5	50,8	73,2	72,1	35,7	33,5	2 556	
Département								
Aire Métropolitaine	97,6	74,3	82,7	81,6	63,2	56,7	1 016	
Ouest (sans Aire Métro.)	92,2	53,0	74,5	79,6	42,7	38,9	758	
Sud-Est	87,4	49,7	77,8	74,3	38,7	37,2	227	
Nord	80,1	58,8	74,2	73,2	40,9	37,4	385	
Nord-Est	86,5	52,3	79,3	77,0	40,2	38,4	146	
Artibonite	82,8	50,3	70,2	68,8	31,5	28,4	754	
Centre	88,8	62,4	80,0	79,5	50,3	46,9	331	
Sud	90,4	49,5	80,7	76,3	39,3	39,3	299	
Grande-Anse	97,4	49,9	80,6	68,4	42,2	40,0	179	
Nord-Ouest	85,4	49,7	79,0	74,2	37,6	35,7	233	
Nippes	87,4	52,6	73,1	72,1	39,5	38,2	109	
Niveau d'instruction								
Aucun	84,5	43,0	66,3	57,6	30,2	27,9	566	
Primaire/alphab.	84,2	48,0	71,7	69,6	32,1	30,1	1 860	
Secondaire +	96,3	71,1	85,4	87,5	61,2	55,7	2 012	
Quintile de bien-être économique								
Le plus pauvre	80,9	48,4	72,4	62,6	31,8	29,6	719	
Second	82,7	49,1	70,3	69,4	31,6	30,1	839	
Moyen	88,6	51,2	76,4	76,9	38,3	35,1	831	
Quatrième	94,1	62,9	80,3	81,7	52,6	48,2	943	
Le plus riche	98,0	71,4	83,6	84,8	62,3	56,7	1 105	
Ensemble 15-49	89,7	57,9	77,2	76,2	45,0	41,4	4 438	
Ensemble 15-59	89,4	57,6	76,8	74,9	44,5	40,6	4 958	

¹ Les deux idées erronées les plus courantes sont la transmission par les piqûres de moustiques et le fait de partager les repas avec une personne infectée.

² Sont considérés comme ayant une connaissance « complète », les hommes qui déclarent qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté, qui rejettent les idées locales erronées les plus courantes à propos de la transmission du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida.

Enfin, dans ce tableau, sont présentés également les proportions de femmes qui ont une connaissance considérée comme complète du VIH/sida. Sont ainsi définies les femmes qui savent qu'on peut réduire le risque d'infection du virus du sida en utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté, qui rejettent les deux idées erronées locales les plus courantes (voir en note du tableau 14.3.1) à propos de la transmission du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut néanmoins avoir le virus du sida. Près d'une femme sur trois (32 %) peut être considérée comme ayant une connaissance correcte du sida. On constate ici le même type de variations que celles précédemment observées.

Le tableau 14.3.2 présente les mêmes résultats pour les hommes. Globalement, on ne constate pas d'écart très important entre les hommes et les femmes. Les variations observées selon les caractéristiques sociodémographiques sont identiques à celles déjà notées chez les femmes. Cependant, la proportion d'hommes de 15-49 ans ayant une connaissance considérée comme complète du VIH/sida est plus élevée que celle des femmes (41 % contre 32 %).

14.1.4 Connaissance de la transmission mère-enfant

Au cours de l'enquête, on a demandé à tous les enquêtés s'ils savaient que le virus qui cause le sida pouvait être transmis de la mère à son enfant par l'allaitement et que le risque de transmission maternelle pouvait être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère au cours de la grossesse. Le tableau 14.4 présente les résultats à ces questions.

Parmi les femmes, 82 %, ont déclaré que le sida pouvait se transmettre en allaitant. Chez les hommes, cette proportion est de 89 %. En outre, on ne constate pas de variations importantes entre les différentes caractéristiques sociodémographiques, hormis dans les départements : la proportion varie chez les femmes d'un minimum de 78 % dans la Grande Anse et le Sud-Est à 91 % dans le Sud ; chez les hommes, cette proportion varie de 86 % dans le Sud-Est à 96 % dans le Sud. On note que même parmi les femmes enceintes actuellement, le pourcentage connaissant la transmission lors de l'allaitement n'est pas très différent de celui des femmes non enceintes (85 % contre 82 %).

En outre, environ 36 % des femmes et 31 % des hommes ont déclaré que le risque de transmission maternelle du VIH à l'enfant pouvait être réduit par la prise de médicaments spéciaux par une mère séropositive. Parmi les hommes et les femmes de l'Aire Métropolitaine, parmi ceux de niveau secondaire ou plus et parmi ceux du quintile le plus riche, cette proportion est plus élevée. La remarque concernant les femmes enceintes comparée à celles qui ne le sont pas prévaut également ici (35 % contre 36 %).

Tableau 14.4 Connaissance de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant

Pourcentage de femmes et d'hommes qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant par l'allaitement et que le risque de transmission maternelle du VIH à l'enfant peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère durant la grossesse, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV 2005-2006

Caractéristique	Femmes				Hommes			
	Le VIH peut être transmis en allaitant	Le risque de transmission maternelle du VIH à l'enfant peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère durant la grossesse	Le VIH peut être transmis en allaitant et le risque de transmission maternelle peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux durant la grossesse	Effectif de femmes	Le VIH peut être transmis en allaitant	Le risque de transmission maternelle du VIH à l'enfant peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère durant la grossesse	Le VIH peut être transmis en allaitant et le risque de transmission maternelle peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux durant la grossesse	Effectif d'hommes
Groupe d'âges								
15-19	80,0	38,4	34,2	2 701	88,2	28,2	25,1	1 211
20-24	82,9	39,1	33,6	2 004	86,9	38,8	34,1	893
25-29	82,5	40,1	35,9	1 761	90,1	33,3	30,9	597
30-39	83,0	33,3	30,0	2 412	88,7	27,3	23,7	969
40-49	82,1	28,3	25,8	1 879	91,2	27,0	25,4	768
15-24	81,2	38,7	34,0	4 704	87,6	32,7	28,9	2 104
État matrimonial								
Célibataire	79,5	39,2	34,2	3 454	88,2	32,6	29,3	2 325
A déjà eu des rapports sexuels	80,1	44,3	37,6	1 327	89,1	35,5	31,7	1 766
N'a jamais eu de rapports sexuels	79,2	36,0	32,1	2 128	85,4	23,5	21,6	559
En union	83,3	34,9	31,5	6 323	89,8	28,3	25,4	1 894
Divorcé/séparé/veuf	82,3	30,5	27,1	980	87,0	29,0	25,6	218
Grossesse actuelle								
Actuellement enceinte	84,9	34,7	32,2	654	na	na	na	na
Pas enceinte/pas sûre	81,8	36,0	31,9	10 103	na	na	na	na
Milieu de résidence								
Aire Métropolitaine	81,8	48,6	41,3	2 773	86,0	39,6	34,7	1 016
Autres Villes	83,3	36,3	32,9	2 232	87,5	36,2	31,9	865
Ensemble urbain	82,5	43,2	37,6	5 005	86,7	38,0	33,4	1 881
Rural	81,5	29,6	27,1	5 752	90,4	25,1	23,0	2 556
Département								
Aire Métropolitaine	81,8	48,6	41,3	2 773	86,0	39,6	34,7	1 016
Ouest (sans Aire Métro.)	84,0	29,7	26,8	1 808	90,9	27,2	24,4	758
Sud-Est	78,3	28,1	26,3	487	86,4	23,3	21,4	227
Nord	78,7	29,0	26,9	1 036	91,7	31,1	28,9	385
Nord-Est	83,4	31,7	29,1	339	91,9	27,4	25,6	146
Artibonite	79,4	29,3	25,5	1 654	85,1	31,1	26,8	754
Centre	84,2	43,0	41,2	811	91,7	24,5	23,1	331
Sud	91,0	31,6	30,2	669	96,3	30,4	29,1	299
Grande-Anse	78,3	40,5	36,7	355	87,0	31,3	27,2	179
Nord-Ouest	79,6	28,7	24,9	593	87,4	22,1	20,4	233
Nippes	84,6	30,9	28,9	232	94,2	20,2	18,7	109
Niveau d'instruction								
Aucun	76,9	25,3	23,5	2 169	91,5	17,1	16,7	566
Primaire/alphab.	84,0	32,0	29,3	4 553	89,3	24,9	23,2	1 860
Secondaire +	82,4	46,0	39,5	4 034	87,6	39,7	34,4	2 012
Quintile de bien-être économique								
Le plus pauvre	77,1	27,3	25,9	1 656	90,7	18,4	17,4	719
Second	81,2	26,9	24,9	1 762	92,1	22,6	21,1	839
Moyen	82,5	32,1	28,6	1 985	90,8	29,9	28,0	831
Quatrième	85,3	36,1	31,9	2 539	84,6	31,3	25,7	943
Le plus riche	81,9	49,1	42,4	2 814	87,2	44,6	39,8	1 105
Ensemble 15-49	82,0	35,9	32,0	10 757	88,8	30,6	27,4	4 438
Ensemble hommes 15-59	na	na	na	na	88,6	29,6	26,4	4 958

na = Non applicable

14.2 STIGMATISATION ENVERS LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA

Le comportement que les gens adopteraient dans différentes situations face à des personnes séropositives ou malades du sida est révélateur du niveau de stigmatisation et de discrimination. Au cours de l'EMMUS-IV, des questions ont été posées aux enquêtés ayant entendu parler du sida pour savoir comment ils se comporteraient face à des personnes ayant été infectées. Plus précisément, on a cherché à savoir si les enquêtés seraient prêts à s'occuper chez eux d'un parent vivant avec le VIH/sida ou s'ils achèteraient des légumes frais à un commerçant vivant avec le VIH/sida. On leur a également demandé si, de leur point de vue, une enseignante vivant avec le VIH/sida devrait être autorisée à continuer d'enseigner et si l'état de santé d'un membre de la famille atteint de sida devrait être gardé secret ou divulgué. Les résultats sont présentés aux tableaux 14.5.1 pour les femmes et 14.5.2 pour les hommes.

Environ, six femmes sur dix (61 %) ont déclaré qu'elles seraient prêtes à prendre soin chez elles d'un membre de la famille atteint du sida.

Par contre, seulement 28 % des femmes ont répondu qu'elles pourraient acheter des légumes frais chez un commerçant atteint de sida.

En outre, près d'un tiers des femmes (35 %) pensent qu'une enseignante vivant avec le VIH/sida devrait être autorisée à continuer d'enseigner à l'école.

On note également que, dans l'ensemble, plus de sept femmes sur dix (73 %) ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire de garder secret l'état d'un membre de la famille atteint du sida.

Globalement, un peu plus d'une femme sur dix (11 %) se montrerait tolérante envers les personnes vivant avec le VIH/sida dans les quatre situations citées. Les variations selon les caractéristiques sociodémographiques sont très marquées. Les femmes du milieu urbain se montreraient plus tolérantes que celles du milieu rural (15 % contre 7 %). De même, 19 % des femmes ayant un niveau secondaire ou plus feraient preuve de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH/sida contre 3 % parmi celles sans instruction. On observe un écart aussi important entre les femmes du quintile le plus pauvre et celles du plus riche (4 % contre 18 %). Dans les départements, cette proportion varie d'un minimum de 7 % dans le Nord à un maximum de 13 % dans le Sud.

Le tableau 14.5.2, présentant les mêmes résultats pour les hommes, montre que ceux-ci se montreraient un peu plus tolérants que les femmes (16 % contre 11 %) s'ils se trouvaient confrontés aux quatre situations citées. De plus, comme chez les femmes, ce sont les hommes du milieu urbain (22 % contre 11 % en rural), ceux ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus (26 % contre 4 %) et ceux des deux quintiles les plus riches (19 % et 26 % contre 10 % dans le plus pauvre) qui se comporteraient de la manière la plus tolérante. Par contre, il faut souligner que les hommes les plus jeunes (15-19 ans) et les plus âgés (40-49 ans) (11 % dans les deux cas) sont ceux qui se montreraient le moins fréquemment tolérants envers les personnes vivant avec le VIH/sida.

Tableau 14.5.1 Attitudes de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH/sida : femmes

Pourcentage de femmes ayant entendu parler du sida exprimant des attitudes de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH/sida, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV 2005-2006

Caractéristique	Pourcentage de femmes qui :				Pourcentage exprimant les quatre attitudes de tolérance	Effectif de femmes ayant entendu parler du VIH/sida
	Seraient prêtes à s'occuper chez elle d'un parent vivant avec le VIH/sida	Achèteraient des légumes frais à un commerçant vivant avec le VIH/sida	Pensent qu'une enseignante VIH devrait être autorisée à continuer d'enseigner	Pensent qu'il n'est pas nécessaire de garder secret l'état d'un membre de la famille vivant avec le VIH/sida		
Groupe d'âges						
15-19	59,3	27,2	35,7	68,6	9,8	2 663
20-24	63,5	31,2	40,6	70,9	12,5	1 996
25-29	62,2	33,4	39,7	74,2	13,3	1 754
30-39	58,7	27,1	31,7	75,1	10,1	2 405
40-49	61,3	23,7	25,7	77,3	8,7	1 870
15-24	61,1	29,0	37,8	69,6	10,9	4 659
État matrimonial						
Célibataire	63,3	31,7	41,3	68,6	12,7	3 407
A déjà eu de rapports sexuels	67,6	34,5	46,1	68,1	14,3	1 323
N'a jamais eu de rapports sexuels	60,6	29,9	38,3	68,8	11,7	2 083
En union	59,0	26,8	31,4	74,9	9,9	6 305
Divorcée/séparée/veuve	62,9	26,6	32,1	75,4	9,4	976
Milieu de résidence						
Aire Métropolitaine	70,3	39,9	50,2	66,9	15,5	2 773
Autres Villes	65,2	33,7	36,4	74,4	14,0	2 225
Ensemble urbain	68,0	37,1	44,1	70,2	14,8	4 998
Rural	54,4	20,6	26,3	75,3	7,1	5 689
Département						
Aire Métropolitaine	70,3	39,9	50,2	66,9	15,5	2 773
Ouest (sans Aire Métro.)	58,8	23,7	32,2	76,4	8,4	1 803
Sud-Est	54,4	22,8	29,0	72,7	9,6	483
Nord	55,9	22,4	27,2	70,5	6,9	1 025
Nord-Est	64,0	22,7	27,4	72,5	8,4	338
Artibonite	49,3	21,6	24,1	84,8	9,7	1 628
Centre	59,6	22,1	28,6	70,7	8,2	798
Sud	67,3	27,0	32,5	71,5	12,8	669
Grande-Anse	63,0	38,5	34,8	64,1	10,8	353
Nord-Ouest	57,4	27,2	30,7	73,2	8,9	588
Nippes	62,2	33,0	33,2	71,7	9,4	230
Niveau d'instruction						
Aucune instruction	50,1	15,4	19,2	74,0	3,1	2 146
Primaire/alphab.	55,1	21,5	26,1	74,8	6,8	4 509
Secondaire +	72,8	43,0	52,4	70,3	19,3	4 033
Quintile de bien-être économique						
Le plus pauvre	48,3	15,1	20,6	69,6	4,1	1 617
Second	51,9	17,3	22,2	75,6	4,4	1 746
Moyen	57,6	25,1	26,3	76,9	9,0	1 977
Quatrième	64,7	31,4	39,2	73,1	12,6	2 535
Le plus riche	72,1	42,3	52,1	70,2	18,1	2 813
Ensemble 15-49	60,8	28,3	34,6	72,9	10,7	10 688

Tableau 14.5.2 Attitudes de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH : hommes

Pourcentage d'hommes ayant entendu parler du sida exprimant des attitudes de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV 2005-2006

Caractéristique	Pourcentage d'hommes qui :				Pourcentage exprimant les quatre attitudes de tolérance	Effectif d'hommes ayant entendu parler du VIH/sida
	Seraient prêts à s'occuper d'un parent vivant avec le VIH	Achèteraient des légumes frais à un commerçant vivant avec le VIH	Pensent qu'une enseignante VIH devrait être autorisée à continuer d'enseigner	Pensent qu'il n'est pas nécessaire de garder secret l'état d'un membre de la famille vivant avec le VIH		
Groupe d'âges						
15-19	56,5	32,1	36,5	73,4	11,0	1 201
20-24	65,4	45,2	51,6	75,7	20,2	886
25-29	64,5	43,5	46,6	80,9	21,2	597
30-39	64,1	39,5	43,9	81,1	18,1	968
40-49	58,7	29,7	30,9	83,5	10,6	766
15-24	60,3	37,7	42,9	74,4	14,9	2 087
État matrimonial						
Célibataire	61,4	39,2	43,4	74,9	16,2	2 308
A déjà eu des rapports sexuels	64,5	41,3	45,9	76,5	17,2	1 763
N'a jamais eu de rapports sexuels	51,1	32,4	35,1	69,9	12,8	545
En union	60,8	35,4	40,2	81,9	14,8	1 892
Divorcé/séparé/veuf	67,8	37,5	34,1	82,3	18,3	218
Milieu de résidence						
Aire Métropolitaine	65,2	55,2	61,5	80,4	23,5	1 016
Autres Villes	71,2	42,6	50,0	76,1	21,1	863
Ensemble urbain	67,9	49,4	56,2	78,4	22,4	1 880
Rural	56,6	28,6	30,7	78,2	10,8	2 539
Département						
Aire Métropolitaine	65,2	55,2	61,5	80,4	23,5	1 016
Ouest (sans Aire Métro.)	57,1	33,8	36,7	74,8	14,9	753
Sud-Est	61,3	26,4	34,1	77,4	12,5	221
Nord	61,9	29,4	33,6	79,8	13,1	384
Nord-Est	56,5	31,7	35,7	74,7	11,8	146
Artibonite	58,8	22,5	29,4	82,9	11,3	754
Centre	60,2	53,6	39,7	74,6	10,0	325
Sud	68,3	29,6	37,1	76,2	16,3	299
Grande-Anse	74,9	38,9	41,9	74,1	16,5	179
Nord-Ouest	55,2	34,8	42,9	80,6	16,4	233
Nippes	55,8	36,9	37,3	71,6	13,2	109
Niveau d'instruction						
Aucun	46,3	22,7	21,1	74,5	4,1	563
Primaire/alphab.	55,3	25,5	27,0	79,0	8,1	1 845
Secondaire +	71,3	52,6	60,6	78,7	25,9	2 010
Quintile de bien-être économique						
Le plus pauvre	51,0	29,4	29,5	75,7	9,8	711
Second	53,5	22,5	24,0	79,1	7,6	834
Moyen	61,6	26,8	30,5	79,4	12,0	826
Quatrième	66,3	45,6	51,2	77,8	19,0	943
Le plus riche	69,9	55,0	62,6	79,0	25,6	1 105
Ensemble 15-49	61,4	37,5	41,5	78,3	15,7	4 418
Ensemble 15-59	60,8	36,3	40,2	78,6	15,0	4 938

14.3 TEST DU VIH

Au cours de l'EMMUS-IV, on a demandé aux enquêtés s'ils avaient déjà effectué un test de dépistage du VIH, et dans le cas d'une réponse affirmative, s'ils avaient reçu les résultats de ce test. Les tableaux 14.6.1, 14.6.2 et 14.6.3 fournissent les résultats à ces questions.

Le tableau 14.6.1, présente le pourcentage des hommes et des femmes ayant effectué un test du VIH et le pourcentage en ayant reçu les résultats au cours des 12 derniers mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques. Une faible proportion de femmes (18 %) a déclaré avoir été testée pour le VIH à un moment quelconque. Parmi les femmes de niveau d'instruction secondaire ou plus (29 %), celles vivant dans les ménages les plus riches (29 %), celles en union (24 %) et celles du milieu urbain (25 %), cette proportion est plus élevée. En outre, on constate que parmi les femmes, 8 % ont effectué le test et ont reçu les résultats au cours des 12 derniers mois. Cette proportion, bien que faible, varie d'un minimum de 2 % parmi celles qui n'ont jamais eu de rapports sexuels et de 3 % parmi celles du quintile le plus pauvre à un maximum de 13 % parmi celles de 25-29 ans et de niveau secondaire ou plus.

Une proportion d'hommes plus faible que celle des femmes ont effectué, à un moment quelconque, un test du VIH/sida (11 %). Parmi les hommes, on constate que 89 % contre 81 % chez les femmes n'ont jamais été testés. Au cours des 12 derniers mois, seulement 5 % contre 8 % chez les femmes ont effectué un test et ont eu connaissance des résultats. C'est dans les mêmes sous-groupes de population que les femmes que l'on constate les proportions les plus élevées de ceux qui ont effectué récemment un test du VIH et qui en ont reçu les résultats.

Le tableau 14.6.2 présente les proportions de femmes ayant eu une naissance au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui ont reçu des conseils sur le VIH au cours d'une visite prénatale, qui ont été testées au cours des visites prénatales pour la naissance la plus récente et qui ont reçu, ou non, les résultats des tests, selon certaines caractéristiques sociodémographiques.

Dans l'ensemble, on constate que parmi ces femmes, une sur trois (34 %) a reçu des conseils sur le VIH durant une visite prénatale. Cette proportion varie peu avec l'âge, avec cependant un pic à 25-29 ans (39 %) ; Par contre, on constate des écarts importants en fonction du milieu et des départements de résidence, du niveau d'instruction et du quintile de bien-être. Ce sont celles du milieu urbain (44 % contre 29 % en milieu rural), celles de niveau secondaire ou plus (50 % contre 21 % parmi celles sans instruction) et celles vivant dans un ménage du quintile le plus riche (52 % contre 21 % dans le plus pauvre) qui ont le plus fréquemment reçu des conseils sur le VIH/sida. En outre dans les départements, ce pourcentage oscille entre un maximum de 47 % dans l'Aire Métropolitaine et de 42 % dans le Sud à un minimum de 20 % dans le département du Sud-Est.

De plus, parmi ces femmes, 29 % ont effectué volontairement un test du VIH au cours d'une visite prénatale pour la naissance la plus récente et 26 % en ont reçu les résultats ; Globalement, une femme sur cinq (20 %) a reçu des conseils, a effectué un test et a eu connaissance des résultats au cours d'une visite prénatale. Ce sont surtout les femmes enceintes âgées de 25-29 ans (24 %), celles du milieu urbain (30 %), celles résidant dans l'Aire Métropolitaine (33 %), celles de niveau secondaire ou plus (37 %) et celles vivant dans les ménages les plus riches (39 %) qui ont le plus fréquemment bénéficié des trois services. Dans les départements, on note que ce sont les femmes du Nord, du Nord-Est et de la Grande Anse (au moins 25 %) qui sont proportionnellement les plus nombreuses à avoir reçu ces services.

Tableau 14.6.1 Population ayant effectué un test du VIH et ayant reçu les résultats

Pourcentage de femmes et d'hommes qui ont effectué ou non un test du VIH et pourcentage ayant reçu les résultats au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Femmes							Hommes						
	A reçu les résultats	N'a pas reçu les résultats	N'a jamais été testée	NSP/ND	Total	Pourcentage testé et ayant reçu les résultats dans les 12 derniers mois	Effectif	A reçu les résultats	N'a pas reçu les résultats	N'a jamais été testé	NSP/ND	Total	Pourcentage testé et ayant reçu les résultats dans les 12 derniers mois	Effectif
Groupe d'âges														
15-19	6,2	0,7	91,6	1,5	100,0	4,0	2 701	2,5	0,2	96,5	0,9	100,0	1,7	1 211
20-24	19,8	2,8	76,6	0,9	100,0	9,7	2 004	9,8	1,4	88,1	0,7	100,0	5,7	893
25-29	27,0	2,8	69,2	1,0	100,0	13,1	1 761	19,7	0,7	79,6	0,0	100,0	10,2	597
30-39	20,9	2,0	76,1	1,1	100,0	8,0	2 412	16,0	0,9	83,0	0,1	100,0	6,9	969
40-49	12,8	1,0	85,2	1,1	100,0	4,1	1 879	8,9	0,8	90,1	0,2	100,0	4,0	768
15-24	12,0	1,6	85,2	1,2	100,0	6,4	4 704	5,6	0,7	92,9	0,8	100,0	3,4	2 104
État matrimonial														
Célibataire	7,4	0,5	90,7	1,4	100,0	4,7	3 454	6,9	0,6	91,7	0,7	100,0	3,8	2 325
A déjà eu des rapports sexuels	14,0	1,0	84,8	0,2	100,0	9,1	1 327	8,8	0,7	90,4	0,2	100,0	4,8	1 766
N'a jamais eu de rapports sexuels	3,3	0,3	94,3	2,1	100,0	1,9	2 128	1,2	0,4	95,9	2,5	100,0	0,8	559
En union	21,4	2,5	75,2	0,9	100,0	9,0	6 323	13,6	1,0	85,3	0,1	100,0	6,6	1 894
Divorcé/séparé/veuf	17,9	1,2	79,5	1,4	100,0	7,5	980	18,0	0,4	81,6	0,0	100,0	7,4	218
Milieu de résidence														
Aire Métropolitaine	24,4	2,0	73,0	0,6	100,0	10,6	2 773	17,2	0,6	82,3	0,0	100,0	8,2	1 016
Autres Villes	20,1	2,1	77,1	0,7	100,0	9,6	2 232	13,8	1,6	84,4	0,2	100,0	7,7	865
Ensemble urbain	22,5	2,1	74,8	0,7	100,0	10,1	5 005	15,6	1,0	83,3	0,1	100,0	8,0	1 881
Rural	11,4	1,5	85,5	1,5	100,0	5,1	5 752	6,4	0,6	92,3	0,7	100,0	3,1	2 556
Département														
Aire Métropolitaine	24,4	2,0	73,0	0,6	100,0	10,6	2 773	17,2	0,6	82,3	0,0	100,0	8,2	1 016
Ouest (sans Aire Métrop.)	13,7	1,6	84,1	0,6	100,0	4,7	1 808	7,6	0,2	91,5	0,7	100,0	3,0	758
Sud-Est	8,3	1,0	89,5	1,3	100,0	3,2	487	5,3	0,8	91,4	2,6	100,0	2,0	227
Nord	16,5	2,0	80,3	1,1	100,0	7,2	1 036	11,4	1,1	87,1	0,4	100,0	5,9	385
Nord-Est	17,1	1,3	80,6	1,1	100,0	6,2	339	6,7	0,3	92,7	0,3	100,0	2,9	146
Artibonite	11,6	2,2	84,1	2,1	100,0	6,8	1 654	8,2	1,0	90,8	0,0	100,0	3,9	754
Centre	17,7	2,5	78,1	1,8	100,0	9,4	811	12,5	2,6	83,0	1,8	100,0	8,0	331
Sud	13,2	0,4	86,0	0,3	100,0	7,1	669	6,7	0,0	93,3	0,0	100,0	4,0	299
Grande-Anse	16,3	2,0	80,0	1,8	100,0	7,4	355	7,1	0,2	92,6	0,0	100,0	4,5	179
Nord-Ouest	12,9	1,2	84,3	1,5	100,0	7,1	593	7,2	0,7	91,8	0,2	100,0	5,0	233
Nippes	13,2	0,4	84,5	1,9	100,0	4,5	232	6,9	1,4	91,7	0,0	100,0	4,0	109
Niveau d'instruction														
Aucun	7,2	1,3	89,8	1,6	100,0	3,4	2 169	3,8	1,0	94,8	0,5	100,0	1,9	566
Primaire/alphab.	12,2	1,8	84,6	1,4	100,0	4,9	4 553	5,2	0,9	93,1	0,8	100,0	2,9	1 860
Secondaire +	26,5	2,0	71,0	0,5	100,0	12,5	4 034	16,8	0,6	82,5	0,1	100,0	8,2	2 012
Quintile de bien-être économique														
Le plus pauvre	6,5	0,8	89,9	2,8	100,0	3,0	1 656	3,6	1,0	94,2	1,1	100,0	2,3	719
Second	9,3	1,8	87,6	1,3	100,0	5,3	1 762	4,6	0,6	94,2	0,6	100,0	2,2	839
Moyen	13,0	1,8	84,3	0,9	100,0	5,7	1 985	6,1	0,5	92,7	0,6	100,0	3,5	831
Quatrième	19,1	2,0	78,4	0,5	100,0	7,8	2 539	11,5	0,9	87,4	0,1	100,0	5,6	943
Le plus riche	27,3	2,1	69,9	0,7	100,0	12,4	2 814	21,1	0,8	78,1	0,0	100,0	10,2	1 105
Ensemble 15-49	16,6	1,8	80,5	1,1	100,0	7,5	10 757	10,3	0,8	88,5	0,4	100,0	5,2	4 438
Ensemble hommes 15-54	na	na	na	na	na	na	na	9,8	0,7	89,1	0,4	100,0	4,8	4 958

na = Non applicable

Tableau 14.6.2 Femmes enceintes conseillées et testées pour le VIH

Parmi les femmes ayant eu une naissance au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage qui ont reçu des conseils, à qui on a proposé le test du VIH au cours des visites prénatales pour la naissance la plus récente, qui ont accepté de se faire tester et qui ont reçu les résultats du test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	A reçu des conseils sur le VIH durant une visite prénatale	A effectué volontairement un test du VIH au cours des visites prénatales et :		Pourcentage qui a reçu des conseils, a été testé et a reçu les résultats	Nombre de femmes qui ont eu une naissance au cours des 2 dernières années
		A reçu les résultats	N'a pas reçu les résultats		
Groupe d'âges					
15-19	34,6	25,2	1,7	19,8	245
20-24	33,0	24,9	4,2	18,1	582
25-29	38,6	30,7	3,9	23,6	586
30-39	31,8	24,3	2,6	18,3	734
40-49	29,6	19,4	1,9	15,6	171
15-24	33,5	25,0	3,5	18,6	827
Milieu de résidence					
Aire Métropolitaine	47,3	44,6	2,3	32,7	362
Autres Villes	40,8	38,6	5,4	27,2	420
Ensemble urbain	43,8	41,4	4,0	29,7	782
Rural	28,9	17,9	2,8	14,4	1 537
Département					
Aire Métropolitaine	47,3	44,6	2,3	32,7	362
Ouest (sans Aire Métro.)	30,1	21,7	4,1	16,2	393
Sud-Est	19,8	9,5	1,1	8,1	133
Nord	39,2	31,0	5,4	25,8	223
Nord-Est	39,6	33,2	2,7	26,7	84
Artibonite	28,1	18,3	2,9	13,6	407
Centre	28,8	26,0	4,6	17,7	280
Sud	42,1	21,2	0,8	16,5	134
Grande-Anse	40,1	27,7	4,0	24,7	95
Nord-Ouest	30,2	18,8	2,4	13,5	148
Nippes	27,6	20,7	0,4	16,2	60
Niveau d'instruction					
Aucun	20,9	11,2	2,3	8,9	646
Primaire/alphab.	32,8	21,2	2,5	16,0	1 071
Secondaire +	49,9	49,7	5,4	37,3	602
Quintile de bien-être économique					
Le plus pauvre	21,3	10,8	1,3	7,4	563
Second	30,5	17,3	2,1	15,1	474
Moyen	33,0	21,7	4,2	17,6	462
Quatrième	40,0	34,3	2,5	25,7	466
Le plus riche	52,0	55,3	7,0	39,3	353
Ensemble 15-49	33,9	25,8	3,2	19,5	2 319

Le tableau 14.6.3 présente les résultats concernant le test du VIH pour les jeunes femmes et les jeunes hommes de 15-24 ans sexuellement actifs. Dans l'ensemble, seulement 10 % des jeunes femmes ont déclaré avoir effectué un test du VIH et avoir eu connaissance des résultats au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête. Le dépistage du VIH est plus fréquent chez les jeunes femmes ayant un niveau secondaire ou plus (15 %), chez celles vivant dans les ménages les plus riches (13 %) et parmi celles qui connaissent un endroit où se procurer des condoms (12 %). Dans les départements, la proportion varie d'un minimum de 6 % dans l'Ouest et le Sud-Est à un maximum d'au moins 14 % dans le Nord-Est et le Nord-Ouest.

Tableau 14.6.3 Test du VIH parmi les jeunes de 15-24 ans sexuellement actifs

Parmi les jeunes de 15-24 ans sexuellement actifs au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, pourcentage de femmes et d'hommes qui ont effectué un test du VIH et qui ont reçu les résultats au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Femmes		Hommes	
	Pourcentage testé et ayant reçu les résultats dans les 12 derniers mois	Effectif	Pourcentage testé et ayant reçu les résultats dans les 12 derniers mois	Effectif
Groupe d'âges				
15-17	7,7	358	1,0	305
18-19	9,5	553	5,4	271
20-22	11,6	875	6,0	464
23-24	11,0	592	5,4	264
15-19	8,8	911	3,1	576
20-24	11,3	1 467	5,8	729
État matrimonial				
Célibataire	8,1	765	4,1	1 083
A déjà été en union	11,4	1 613	6,9	222
Connait une source pour les condom¹				
Oui	11,5	1 989	4,9	1 209
Non	4,6	389	0,0	96
Milieu de résidence				
Aire Métropolitaine	11,1	688	7,3	351
Autres Villes	12,9	534	6,6	305
Ensemble urbain	11,9	1 222	7,0	656
Rural	8,8	1 156	2,2	649
Département				
Aire Métropolitaine	11,1	688	7,3	351
Ouest (sans Aire Métro.)	6,3	423	0,7	212
Sud-Est	6,2	102	2,3	56
Nord	9,9	235	6,9	98
Nord-Est	15,2	67	2,6	37
Artibonite	11,1	338	2,9	213
Centre	13,2	156	7,5	70
Sud	12,8	123	2,7	105
Grande-Anse	12,2	79	2,6	50
Nord-Ouest	14,2	116	6,2	80
Nippes	7,8	52	(9,1)	33
Niveau d'instruction				
Aucun	4,2	209	0,0	54
Primaire/alphab.	7,0	1 051	2,3	527
Secondaire +	14,7	1 118	6,6	725
Quintile de bien-être économique				
Le plus pauvre	6,5	301	1,7	159
Second	8,0	337	2,3	209
Moyen	10,7	433	3,1	248
Quatrième	10,7	675	3,9	308
Le plus riche	12,8	632	8,6	381
Ensemble	10,4	2 378	4,6	1 305

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés

¹ Amis, famille et à la maison ne sont pas considérés comme source de condom

En ce qui concerne les jeunes hommes, les résultats montrent que la proportion de ceux qui ont effectué un test de dépistage du VIH au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête est deux fois moins élevée (5 %) que celle des jeunes femmes (10 %). Hormis pour les départements, les variations sont de même type que celles observées chez les femmes. Dans les départements, la proportion varie d'un minimum de 1 % dans l'Ouest à un maximum d'environ 7 % dans l'Aire Métropolitaine, le Nord et le Centre.

14.4 OPINIONS SUR LA NÉGOCIATION DE RAPPORTS PROTÉGÉS AVEC LE CONJOINT

La promotion de comportements sexuels sans risque est une des mesures essentielles destinées à contrôler l'épidémie. Il est donc important de savoir si les femmes ont le pouvoir de refuser des rapports sexuels à risques avec leurs mari/partenaires. Au cours de l'enquête, on a donc demandé aux femmes si elles pensaient qu'il était justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari/partenaire ou qu'elle propose l'utilisation de condoms quand elle sait que celui-ci a une IST. En outre, on a demandé aux hommes leur opinion sur l'adoption par les femmes de ce comportement sécuritaire. Les résultats sont présentés au tableau 14.7.

Dans l'ensemble, plus de neuf femmes sur dix (97 %) et huit hommes sur dix (83 %) pensent que cette attitude est justifiée (tableau 14.7). Cette proportion ne varie pas beaucoup selon les caractéristiques sociodémographiques des femmes. Les hommes qui pensent le plus fréquemment qu'il est justifié que les femmes se protègent quand leur mari a une IST sont ceux qui ont un niveau secondaire (86 %), ceux du quintile moyen (87 %) et ceux du plus riche (88 %). Dans les départements, on note que c'est dans le Centre que la proportion d'hommes partageant cette opinion est la plus faible (67 % contre 89 % dans le Sud).

Tableau 14.7 Opinion sur la négociation de rapports sexuels protégés avec le conjoint

Pourcentage de femmes qui pensent que, si le conjoint a une IST, sa femme peut, soit refuser d'avoir des rapports sexuels avec lui, soit proposer l'utilisation du condom, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV 2005-2006

Caractéristique	Femmes				Hommes			
	Refuser les rapports sexuels	Proposer l'utilisation du condom	Refuser les rapports sexuels ou proposer l'utilisation du condom	Effectif de femmes	Refuser les rapports sexuels	Proposer l'utilisation du condom	Refuser les rapports sexuels ou proposer l'utilisation du condom	Effectif d'hommes
Groupe d'âges								
15-19	88,6	88,0	95,4	2 701	78,4	79,2	80,8	1 211
20-24	90,6	93,3	98,0	2 004	82,4	83,2	84,9	893
25-29	92,1	93,6	98,3	1 761	80,3	81,9	84,0	597
30-39	91,7	91,1	98,1	2 412	80,5	80,1	82,2	969
40-49	90,9	89,1	96,9	1 879	80,6	79,1	82,5	768
15-24	89,4	90,3	96,5	4 704	80,1	80,9	82,6	2 104
État matrimonial								
Célibataire	88,6	88,9	96,1	3 454	79,2	79,8	81,6	2 325
A déjà eu des rapports sexuels	91,0	92,2	98,0	1 327	83,3	84,2	85,7	1 766
N'a jamais eu de rapports sexuels	87,1	86,8	94,8	2 128	66,3	65,7	68,4	559
En union	91,6	91,6	97,9	6 323	81,1	81,1	83,7	1 894
Divorcé/séparé/veuf	91,8	91,9	97,0	980	84,1	83,5	85,3	218
Milieu de résidence								
Aire Métropolitaine	87,2	93,7	97,3	2 773	77,5	78,7	80,8	1 016
Autres Villes	92,7	92,4	97,9	2 232	85,9	87,2	88,3	865
Ensemble urbain	89,6	93,1	97,6	5 005	81,4	82,6	84,3	1 881
Rural	91,5	88,7	96,9	5 752	79,5	79,0	81,5	2 556
Département								
Aire Métropolitaine	87,2	93,7	97,3	2 773	77,5	78,7	80,8	1 016
Ouest (sans Aire Métro.)	94,0	90,9	97,8	1 808	85,4	85,1	87,6	758
Sud-Est	93,0	91,7	96,3	487	82,4	83,4	85,6	227
Nord	93,1	89,0	98,3	1 036	77,9	75,2	79,5	385
Nord-Est	91,1	92,4	96,1	339	75,4	76,4	77,7	146
Artibonite	88,9	86,9	96,1	1 654	85,1	86,2	87,2	754
Centre	89,6	88,0	96,0	811	65,6	65,1	67,2	331
Sud	96,2	95,1	99,1	669	85,1	86,7	89,4	299
Grande-Anse	91,5	89,4	97,8	355	84,8	84,6	85,8	179
Nord-Ouest	88,9	88,4	96,7	593	79,2	79,0	80,4	233
Nippes	92,2	91,9	98,4	232	73,5	71,4	75,1	109
Niveau d'instruction								
Aucun	89,4	87,6	96,3	2 169	73,1	72,8	75,7	566
Primaire/alphab.	90,4	88,9	96,6	4 553	78,8	78,4	80,8	1 860
Secondaire +	91,6	94,6	98,5	4 034	83,7	84,7	86,4	2 012
Quintile de bien-être économique								
Le plus pauvre	87,1	84,2	94,0	1 656	67,2	67,0	69,7	719
Second	91,7	89,6	97,4	1 762	80,4	78,6	82,4	839
Moyen	92,5	89,8	97,9	1 985	85,0	85,2	86,8	831
Quatrième	91,9	93,3	98,4	2 539	80,3	82,3	83,5	943
Le plus riche	89,6	93,8	97,5	2 814	85,1	85,8	87,5	1 105
Ensemble 15-49	90,6	90,8	97,2	10 757	80,3	80,5	82,7	4 438
Ensemble hommes 15-59	na	na	na	na	80,6	80,1	82,8	4 958

na = Non applicable

14.5 CONNAISSANCE PAR LES JEUNES DU SIDA ET D'UN ENDROIT OÙ SE PROCURER DES CONDOMS

La pratique des rapports sexuels non protégés est un facteur de propagation du VIH. L'utilisation de condoms est l'un des moyens efficaces pour réduire la contamination du VIH par voie sexuelle, d'où l'importance de la connaissance de son niveau d'accessibilité. Le tableau 14.8 présente les résultats sur la connaissance du sida par les jeunes de 15-24 ans ainsi que sur leur connaissance d'un point d'approvisionnement du condom.

Dans l'ensemble, 32 % des jeunes femmes de 15-24 ans contre 40 % des jeunes hommes de 15-24 ans ont une connaissance « complète » du sida. La proportion de jeunes femmes qui connaissent le sida est particulièrement faible parmi celles qui n'ont aucune instruction (14 %), parmi celles vivant dans les ménages les plus pauvres (18 %) et parmi celles des départements de l'Artibonite et du Centre (25 % dans les deux cas) et du Nord (26 %).

Les résultats de ce tableau révèlent également qu'une proportion élevée de jeunes filles de 15-24 ans (79 %) connaissent un endroit où elles peuvent se procurer des condoms. Des variations importantes sont observées selon les caractéristiques sociodémographiques. En milieu urbain, 85 % des jeunes filles ont déclaré connaître un endroit où se procurer des condoms alors qu'en milieu rural, cette proportion est de 73 %. Le niveau de connaissance d'un endroit où l'on peut se procurer des condoms est plus élevé dans l'Aire Métropolitaine (84 %), dans le Nord-Est, le Sud et les Nippes (83 % dans chaque) que dans les autres départements, en particulier le Sud-Est (65 %). Cette connaissance est positivement associée au niveau d'instruction : 60 % des jeunes filles sans niveau d'instruction savent où se procurer des condoms, contre 72 % de celles ayant un niveau primaire ou alphabétisé et 88 % de celles de niveau secondaire ou plus. Enfin, le pourcentage d'adolescentes connaissant un endroit où elles peuvent se procurer des condoms augmente avec le niveau de bien être économique du ménage dans lequel elles vivent, d'un minimum de 61 % à un maximum de 88 %. Notons aussi que les jeunes femmes de 23-24 ans (85 %) sont celles qui connaissent le plus fréquemment un point d'approvisionnement des condoms.

La proportion de jeunes hommes qui connaissent un endroit où se procurer des condoms est nettement plus élevée que celle des femmes (85 % contre 79 %). Comme chez les femmes, les jeunes hommes de 23-24 ans (94 %), ceux du milieu urbain (93 %), les plus instruits (94 %), ceux issus des ménages les plus riches (95 %), ceux résidant dans l'Aire Métropolitaine (92 %) et du Sud (89 %) connaissent plus fréquemment un endroit où se procurer des condoms que les autres.

Tableau 14.8 Connaissance « complète » du sida par les jeunes et d'un endroit où se procurer des condoms

Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ayant une connaissance « complète » du sida et qui connaissent au moins un endroit où se procurer des condoms, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Femmes			Hommes		
	Pourcentage ayant une connaissance « complète » du sida ¹	Pourcentage connaissant un endroit où se procurer des condoms	Effectif des femmes	Pourcentage ayant une connaissance « complète » du sida ¹	Pourcentage connaissant un endroit où se procurer des condoms	Effectif d'hommes
Groupe d'âges						
15-17	30,5	74,6	1 648	31,4	76,1	777
18-19	31,5	78,8	1 052	39,4	89,5	434
20-22	33,3	80,8	1 237	51,4	89,0	583
23-24	33,2	84,6	767	43,7	93,5	309
15-19	30,9	76,2	2 701	34,2	80,9	1 211
20-24	33,2	82,2	2 004	48,7	90,6	893
État matrimonial						
Célibataire	32,2	76,4	2 979	39,9	84,1	1 898
A déjà eu des rapports sexuels	32,9	83,9	1 018	43,5	91,1	1 368
N'a jamais eu des rapports sexuels	31,9	72,6	1 961	30,6	66,1	530
A déjà été en union	31,3	82,9	1 725	44,8	93,2	205
Milieu de résidence						
Aire Métropolitaine	40,4	84,1	1 287	54,8	92,2	482
Autres Villes	33,9	85,7	1 055	46,4	93,2	444
Ensemble urbain	37,5	84,8	2 342	50,8	92,7	926
Rural	26,3	72,9	2 363	32,2	79,0	1 177
Département						
Aire Métropolitaine	40,4	84,1	1 287	54,8	92,2	482
Ouest (sans Aire Métro.)	28,6	79,5	786	33,8	84,1	388
Sud-Est	32,1	65,0	217	38,6	66,0	112
Nord	26,4	76,0	469	39,1	85,9	174
Nord-Est	27,8	83,4	149	38,2	83,3	64
Artibonite	25,0	77,5	646	28,5	85,3	335
Centre	24,5	70,5	347	50,4	77,8	143
Sud	35,6	83,3	293	34,8	88,7	155
Grande-Anse	33,6	72,7	157	38,3	77,1	86
Nord-Ouest	31,5	75,9	256	39,7	84,2	114
Nippes	37,1	82,6	99	37,5	86,4	52
Niveau d'instruction						
Aucun	14,2	60,1	287	24,9	62,2	107
Primaire/alphab.	23,7	72,1	2 229	28,4	77,7	955
Secondaire +	42,6	88,1	2 188	53,0	94,0	1 042
Quintile de bien-être économique						
Le plus pauvre	18,3	61,4	618	27,7	68,4	303
Second	24,7	71,4	751	32,7	77,0	404
Moyen	28,1	76,9	848	35,0	85,5	403
Quatrième	36,7	84,1	1 187	47,4	91,6	476
Le plus riche	40,5	87,7	1 300	51,7	94,6	517
Ensemble	31,9	78,8	4 704	40,4	85,0	2 104

¹ Sont considérées comme ayant une connaissance « complète », les jeunes qui déclarent qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté, qui rejettent les idées locales erronées les plus courantes à propos de la transmission du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida.

14.6 RAPPORTS SEXUELS À HAUTS RISQUES ET UTILISATION DU CONDOM

Les rapports sexuels qui ont lieu avec un partenaire extraconjugal et non cohabitant sont considérés comme étant des rapports sexuels à hauts risques. Le multipartenariat dans les rapports sexuels accroît le risque d'infection par les IST, en particulier le VIH/sida. Ce risque est d'autant plus important que l'utilisation du condom comme moyen de prévention est faible.

Les tableaux 14.9.1 et 14.9.2 présentent les proportions de femmes et d'hommes qui ont eu des rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête ainsi que les proportions de ceux/celles qui ont utilisé un condom au cours de ces derniers rapports sexuels. Environ une femme de 15-49 ans sur trois (29 %) et près des deux tiers des hommes du même groupe d'âges (62 %) ont eu des rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête. Près d'une femme sur quatre (26 %) et 42 % des hommes ont déclaré avoir utilisé un condom au cours de ces derniers rapports sexuels à hauts risques. La définition des rapports sexuels à hauts risques incluant les rapports sexuels pré-nuptiaux, cela explique les proportions élevées de femmes et d'hommes de 15-19 ans qui ont eu des rapports sexuels à hauts risques. On note que c'est dans ce groupe d'âges que la proportion d'utilisatrices de condoms est la plus élevée (32 % contre 10 % à 40-49 ans). Chez les hommes, c'est parmi ceux de 20-29 ans que cette proportion est la plus élevée (50 % et plus contre 24 % à 40-49 ans). Parmi les célibataires, 38 % des femmes et 43 % des hommes ont utilisé des condoms. Selon le département, on constate que c'est dans l'Aire Métropolitaine (42 % pour les femmes et 67 % pour les hommes), et dans l'Ouest (sans l'Aire Métropolitaine) (31 % pour les femmes et 67 % pour les hommes) que les rapports sexuels à hauts risques ont été les plus fréquents.

On constate également que les rapports sexuels à hauts risques sont plus fréquents en milieu urbain (37 % parmi les femmes et 68 % parmi les hommes) qu'en milieu rural (respectivement, 22 % et 57 %). En outre, les femmes et les hommes de niveau secondaire ou plus (respectivement, 44 % et 73 %) et ceux du quintile le plus riche (42 % pour les femmes et 71 % pour les hommes) ont eu plus fréquemment des rapports sexuels à hauts risques que les autres. Enfin, on note que les catégories d'hommes et de femmes qui ont eu le plus fréquemment de rapports sexuels à hauts risques sont également ceux et celles qui ont déclaré le plus fréquemment avoir utilisé un condom.

Tableau 14.9.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : femmes

Parmi les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, pourcentage de celles qui ont eu des rapports sexuels avec au moins deux partenaires et pourcentage qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal et non cohabitant (rapports à hauts risques) au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête et, parmi ces femmes pourcentage ayant déclaré avoir utilisé un condom la dernière fois qu'elles ont eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal et non cohabitant et, nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie pour les femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels, selon les caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Parmi les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête :			Parmi les femmes qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal et non cohabitant (rapports à hauts risques) au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête :		Parmi les femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels	
	Pourcentage qui ont eu au moins deux partenaires sexuels au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête	Pourcentage qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal et non cohabitant (rapports à hauts risques) au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête	Effectif	Pourcentage qui ont utilisé un condom au cours des derniers rapports à hauts risques	Effectif	Nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie	Effectif
Groupe d'âges							
15-19	2,8	71,1	896	32,3	637	1,5	1 095
20-24	3,1	45,2	1 448	26,1	654	1,9	1 643
25-29	1,7	25,9	1 474	26,1	381	2,2	1 655
30-39	1,3	14,7	2 083	18,1	306	2,1	2 357
40-49	0,9	9,9	1 469	10,0	146	2,1	1 845
15-24	3,0	55,1	2 344	29,2	1 291	1,8	2 738
État matrimonial							
Célibataire	2,7	98,4	940	37,5	925	1,9	1 323
En union	1,7	16,5	6 097	16,2	1 003	2,0	6 304
Divorcée/séparée/veuve	2,5	58,9	334	18,5	197	2,4	967
Milieu de résidence							
Aire Métropolitaine	2,9	42,0	1 809	32,5	759	2,1	2 191
Autres Villes	2,3	31,7	1 481	33,0	469	2,2	1 764
Ensemble urbain	2,6	37,3	3 290	32,7	1 228	2,2	3 955
Rural	1,2	22,0	4 081	16,1	897	1,9	4 640
Département							
Aire Métropolitaine	2,9	42,0	1 809	32,5	759	2,1	2 191
Ouest (sans Aire Métro.)	2,2	30,6	1 280	20,9	391	2,1	1 496
Sud-Est	0,5	20,2	337	16,6	68	1,9	372
Nord	1,3	27,0	718	26,1	194	2,1	835
Nord-Est	1,4	17,6	226	20,9	40	1,9	260
Artibonite	1,7	23,4	1 201	20,4	281	1,9	1 370
Centre	1,1	13,6	560	17,1	76	1,8	615
Sud	1,6	23,7	433	30,2	102	2,0	513
Grande-Anse	1,1	27,8	252	32,8	70	2,2	284
Nord-Ouest	0,9	25,3	390	12,9	99	2,0	469
Nippes	1,1	27,5	165	22,2	45	2,1	188
Niveau d'instruction							
Aucun	0,8	11,5	1 832	4,8	210	2,1	2 089
Primaire/alphab.	1,9	26,4	2 997	15,2	791	2,0	3 485
Secondaire +	2,6	44,2	2 542	37,0	1 123	2,0	3 021
Quintile de bien-être économique							
Le plus pauvre	0,7	15,5	1 215	6,1	188	1,9	1 369
Second	0,8	20,5	1 222	10,5	250	1,8	1 387
Moyen	1,6	24,7	1 397	17,7	345	2,0	1 613
Quatrième	2,7	33,4	1 759	24,0	588	2,2	2 083
Le plus riche	2,8	42,4	1 777	40,6	754	2,2	2 142
Ensemble 15-49	1,9	28,8	7 371	25,7	2 125	2,0	8 595

Tableau 14.9.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : hommes

Parmi les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, pourcentage de ceux qui ont eu des rapports sexuels avec au moins deux partenaires et pourcentage qui ont eu des rapports sexuels avec une partenaire extraconjugale et non cohabitante (rapports à hauts risques) au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête et, parmi ces hommes, pourcentage ayant déclaré avoir utilisé un condom la dernière fois qu'ils ont eu des rapports sexuels avec une partenaire extraconjugale et non cohabitante et, nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie pour les hommes qui ont déjà eu des rapports sexuels, selon les caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Parmi les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête :			Parmi les hommes qui ont eu des rapports sexuels avec une partenaire extraconjugale et non cohabitante (rapports à hauts risques) au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête :		Parmi les hommes qui ont déjà eu des rapports sexuels	
	Pourcentage qui ont eu au moins deux partenaires sexuelles au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête	Pourcentage qui ont eu des rapports sexuels avec une partenaire extraconjugale et non cohabitante (rapports à hauts risques) au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête	Effectif	Pourcentage qui ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels à hauts risques	Effectif	Nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie	Effectif
Groupe d'âges							
15-19	27,8	99,1	562	33,0	557	4,8	761
20-24	38,2	91,0	684	52,6	622	9,7	796
25-29	30,7	65,8	540	50,3	356	13,3	566
30-39	28,5	42,5	907	39,0	386	12,3	931
40-49	24,6	27,6	729	24,0	201	13,5	734
15-24	33,5	94,6	1 247	43,3	1 179	7,3	1 557
État matrimonial							
Célibataire	31,5	99,5	1 362	43,3	1 356	7,4	1 740
En union	28,8	31,8	1 878	37,6	597	13,1	1 837
Divorcée/séparée/veuve	28,7	92,8	182	45,9	169	15,3	211
Milieu de résidence							
Aire Métropolitaine	29,6	67,2	829	56,3	557	11,8	920
Autres Villes	35,2	69,1	681	46,6	470	10,4	771
Ensemble urbain	32,1	68,0	1 510	51,9	1 027	11,2	1 691
Rural	28,0	57,2	1 913	32,5	1 095	10,2	2 097
Département							
Aire Métropolitaine	29,6	67,2	829	56,3	557	11,8	920
Ouest (sans Aire Métro.)	35,8	67,2	537	46,9	361	13,5	634
Sud-Est	26,8	57,6	167	37,0	96	10,1	177
Nord	31,1	56,5	293	32,6	166	9,8	313
Nord-Est	27,2	55,0	114	40,4	62	9,3	119
Artibonite	31,1	61,6	601	29,1	370	8,7	676
Centre	17,4	39,6	237	35,6	94	7,0	262
Sud	27,1	64,5	233	37,4	150	9,6	240
Grande-Anse	28,7	65,9	139	37,1	91	11,5	151
Nord-Ouest	37,2	65,4	188	30,8	123	10,7	204
Nippes	18,7	60,4	85	42,4	52	9,8	92
Niveau d'instruction							
Aucun	22,4	36,2	481	9,2	174	10,7	505
Primaire/alphab.	26,3	58,5	1 344	26,7	786	9,5	1 464
Secondaire +	35,0	72,7	1 597	57,0	1 161	11,5	1 819
Quintile de bien-être économique							
Le plus pauvre	22,7	48,0	532	19,2	255	8,3	561
Second	24,2	52,7	619	21,1	326	8,3	675
Moyen	32,1	62,8	640	36,2	402	11,3	695
Quatrième	31,5	67,7	733	44,9	496	10,6	846
Le plus riche	35,0	71,4	898	62,7	641	13,1	1 012
Ensemble 15-49	29,8	62,0	3 422	41,9	2 122	10,6	3 789

14.7 ACTIVITÉ SEXUELLE CHEZ LES JEUNES

14.7.1 Âge aux premiers rapports sexuels des jeunes

En tant que déterminant de l'activité sexuelle, l'âge aux premiers rapports sexuels des jeunes de 15-24 ans revêt une grande importance en matière de prévention du VIH/sida. Pour cette raison l'enquête a collecté des données sur l'activité sexuelle des jeunes. Le tableau 14.10 présente les proportions d'hommes et de femmes âgés de 15-24 ans qui ont eu leurs premiers rapports sexuels en atteignant les âges exacts de 15 et 18 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques.

Tableau 14.10 Âge des jeunes de 15-24 ans aux premiers rapports sexuels

Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15-24 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels en atteignant les âges exacts de 15 et 18 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Femmes				Hommes			
	Pourcentage qui ont eu des rapports sexuels avant 15 ans	Effectif d'enquêtées de 15-24 ans	Pourcentage qui ont eu des rapports sexuels avant 18 ans	Effectif d'enquêtées de 18-24 ans	Pourcentage qui ont eu des rapports sexuels avant 15 ans	Effectif d'enquêtés de 15-24 ans	Pourcentage qui ont eu des rapports sexuels avant 18 ans	Effectif d'enquêtés de 18-24 ans
Groupe d'âges								
15-17	14,7	1 648	na	na	44,0	777	na	na
18-19	16,4	1 052	57,4	1 052	38,1	434	74,0	434
20-22	14,2	1 237	55,1	1 237	45,7	583	76,7	583
23-24	12,4	767	50,6	767	39,7	309	74,4	309
15-19	15,3	2 701	57,4	1 052	41,9	1 211	74,0	434
20-24	13,5	2 004	53,4	2 004	43,7	893	75,9	893
État matrimonial								
A déjà été en union	7,2	2 979	30,9	1 489	42,5	1 898	73,6	1 130
N'a jamais été en union	27,2	1 725	77,4	1 567	43,9	205	85,0	197
Connait une source de condom¹								
Oui	15,0	3 707	56,3	2 477	45,3	1 788	77,6	1 197
Non	12,8	997	48,1	578	27,4	315	53,9	130
Milieu de résidence								
Aire Métropolitaine	15,7	1 287	54,7	886	46,1	482	77,5	349
Autres Villes	14,4	1 055	55,7	685	49,0	444	83,0	285
Ensemble urbain	15,1	2 342	55,1	1 571	47,5	926	80,0	634
Rural	14,0	2 363	54,4	1 485	38,8	1 177	71,0	693
Département								
Aire Métropolitaine	15,7	1 287	54,7	886	46,1	482	77,5	349
Ouest (sans Aire Métro.)	13,4	786	59,1	515	46,2	388	72,8	238
Sud-Est	15,1	217	50,4	137	32,2	112	62,7	63
Nord	14,0	469	53,3	303	42,9	174	75,2	104
Nord-Est	13,1	149	47,5	97	32,8	64	67,7	36
Artibonite	12,6	646	58,9	410	46,4	335	83,3	202
Centre	13,4	347	43,0	210	27,4	143	62,1	79
Sud	15,5	293	57,6	174	46,8	155	76,9	98
Grande-Anse	16,6	157	57,2	96	30,7	86	72,7	54
Nord-Ouest	17,4	256	50,7	164	47,1	114	78,7	68
Nippes	17,3	99	60,9	66	33,1	52	77,1	36
Niveau d'instruction								
Aucun	28,6	287	68,0	223	31,3	107	57,8	73
Primaire/alphab.	17,1	2 229	62,0	1 235	39,3	955	70,0	446
Secondaire +	10,1	2 188	47,4	1 598	46,9	1 042	79,8	808
Quintile de bien-être économique								
Le plus pauvre	16,7	618	57,4	378	33,5	303	59,8	155
Second	13,9	751	50,2	484	35,9	404	70,2	240
Moyen	16,3	848	59,8	516	38,3	403	73,7	244
Quatrième	16,3	1 187	60,2	813	52,7	476	84,9	317
Le plus riche	11,2	1 300	48,1	864	47,4	517	77,9	371
Ensemble	14,6	4 704	54,8	3 056	42,6	2 104	75,3	1 327

na = Non applicable

¹ Amis, famille et à la maison ne sont pas considérés comme source de condom

Dans l'ensemble, 15 % des femmes de 15-24 ans avaient déjà eu des rapports sexuels avant d'atteindre 15 ans ; chez les hommes du même âge, la proportion correspondante est plus élevée (43 %). Cette proportion varie très peu selon l'âge : de 15 % chez les jeunes filles et 44 % chez les jeunes garçons à 15-17 ans au moment de l'enquête, elle est respectivement de 14 % et 44 % dans le groupe des 20-24 ans. Les proportions de femmes de 15-24 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels avant 15 ans ne varient pas en fonction du milieu de résidence. Selon le département, il y a également peu de variation, les niveaux oscillant entre 13 % et 17 %. Selon le niveau de bien-être économique, on ne constate pas de tendance régulière. Le niveau d'instruction influence la précocité des rapports sexuels chez les femmes : 29 % parmi celles sans niveau d'instruction, 17 % pour celles de niveau primaire ou alphabétisé et 10 % pour celles de niveau secondaire ou plus. Par contre, chez les hommes, on constate le phénomène inverse : 47 % des hommes de niveau secondaire ou plus ont eu leurs premiers rapports sexuels avant 15 ans contre 31 % parmi ceux sans instruction. Dans les départements, on note que chez les hommes, c'est dans le Centre que la proportion d'hommes ayant eu des rapports sexuels précoces est la plus faible (27 %).

Par ailleurs, toujours au tableau 14.10, on remarque que plus de la moitié des femmes de 15-24 ans (55 %) et plus des trois quarts des hommes de 15-24 ans (75 %) avaient déjà eu des rapports sexuels avant d'atteindre 18 ans.

Le tableau 14.11 fournit les pourcentages d'hommes et de femmes âgés de 15-24 ans qui ont utilisé un condom au cours de leurs premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques sociodémographiques.

Une faible proportion de femmes et d'hommes de 15-24 ans (15 % dans chaque cas) ont utilisé un condom lors de leurs premiers rapports sexuels. Les femmes de 15-19 ans ont plus fréquemment utilisé un condom lors de ces premiers rapports sexuels que celles de 20-24 ans : respectivement 21 % et 11 %. Les femmes de 15-24 ans actuellement célibataires (11 %) ont été beaucoup moins nombreuses à utiliser des condoms aux premiers rapports sexuels que celles qui ont déjà été en union (22 %). Par ailleurs, les jeunes femmes du milieu urbain (18 %), celles des départements du Nord-Est (25 %), de la Grande-Anse (24 %), du Sud (22 %), des Nippes (19 %) et de l'Aire Métropolitaine (18 %), celles de niveau secondaire ou plus (21 %), celles des ménages les plus riches (24 %) et celles qui connaissent un point d'approvisionnement pour les condoms (17 %) sont celles qui ont le plus fréquemment utilisé des condoms lors des premiers rapports sexuels.

Chez les hommes, on observe globalement les mêmes variations selon les caractéristiques sociodémographiques que celles déjà constatées chez les femmes.

Tableau 14.11 Utilisation des condoms au cours des premiers rapports sexuels parmi les jeunes

Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 qui ont utilisé un condom au cours des premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Femmes		Hommes	
	Pourcentage ayant déclaré avoir utilisé un condom au cours des premiers rapports sexuels	Effectif de femmes ayant eu des rapports sexuels	Pourcentage ayant déclaré avoir utilisé un condom au cours des premiers rapports sexuels	Effectif d'hommes ayant eu des rapports sexuels
Groupe d'âges				
15-17	22,4	444	10,8	419
18-19	20,3	653	16,2	343
20-22	12,0	978	18,1	521
23-24	9,3	668	12,7	290
15-19	21,2	1 097	13,2	762
20-24	10,9	1 646	16,1	811
État matrimonial				
A déjà été en union	21,7	1 018	14,6	1 368
Célibataire	11,1	1 725	15,7	205
Connaît une source de condom¹				
Oui	16,5	2 283	15,3	1 438
Non	7,9	459	8,8	135
Milieu de résidence				
Aire Métropolitaine	18,3	800	21,3	410
Autres Villes	18,2	626	15,7	367
Ensemble urbain	18,2	1 426	18,6	777
Rural	11,5	1 317	10,9	796
Département				
Aire Métropolitaine	18,3	800	21,3	410
Ouest (sans Aire Métro.)	14,0	497	12,0	280
Sud-Est	8,4	112	20,1	71
Nord	12,6	280	16,4	118
Nord-Est	24,6	75	26,3	40
Artibonite	13,2	374	9,2	265
Centre	4,3	168	15,2	83
Sud	22,0	148	6,2	120
Grande-Anse	23,7	89	14,5	60
Nord-Ouest	8,6	143	6,5	89
Nippes	18,9	56	21,1	37
Niveau d'instruction				
Aucun	2,8	227	15,1	66
Primaire/alphab.	11,3	1 199	7,5	617
Secondaire +	20,5	1 317	19,7	890
Quintile de bien-être économique				
Le plus pauvre	5,7	344	8,0	176
Second	10,7	392	5,8	270
Moyen	13,6	492	12,3	280
Quatrième	14,0	777	13,0	404
Le plus riche	23,6	738	26,0	443
Ensemble	15,0	2 743	14,7	1 573

¹ Amis, famille et à la maison ne sont pas considérés comme source de condom

14.7.2 Rapports sexuels à hauts risques et utilisation du condom chez les jeunes

Le tableau 14.12 présente les proportions des jeunes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels à hauts risques et les proportions de ceux/celles qui ont utilisé des condoms au cours de ces derniers rapports sexuels. Les résultats montrent que 55 % des jeunes femmes et 95 % des jeunes hommes ont eu des rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Parmi eux, 29 % des jeunes femmes et 43 % des jeunes hommes ont déclaré avoir utilisé un condom au cours de ces derniers rapports sexuels à hauts risques.

Tableau 14.12 Rappports sexuels à hauts risques et utilisation du condom lors des derniers rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois par les jeunes de 15-24 ans

Parmi les jeunes de 15-24 ans et sexuellement actifs, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal et non cohabitant (rapports à hauts risques) au cours des 12 derniers mois et, parmi ceux-ci, pourcentage qui ont déclaré avoir utilisé un condom la dernière fois qu'ils ont eu des rapports à hauts risques, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Femmes				Hommes			
	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes sexuellement actives au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant utilisé des condoms au cours des rapports sexuels à hauts risques	Effectif de femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes sexuellement actifs au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant utilisé des condoms au cours des rapports sexuels à hauts risques	Effectif d'hommes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois
Groupe d'âges								
15-17	80,9	350	32,0	284	99,5	299	29,5	298
18-19	64,9	545	32,6	354	98,5	263	37,0	259
20-22	49,7	861	27,4	427	94,3	437	51,8	412
23-24	38,5	587	23,6	226	85,1	247	54,1	211
15-19	71,1	896	32,3	637	99,1	562	33,0	557
20-24	45,2	1 448	26,1	654	91,0	684	52,6	622
État matrimonial								
A déjà été en union	98,7	755	36,5	745	99,8	1 044	42,3	1 042
Célibataire	34,4	1 589	19,1	546	67,8	203	51,3	138
Connait une source de condom¹								
Oui	55,6	1 958	31,5	1 090	94,9	1 150	45,8	1 092
Non	52,2	385	16,3	201	91,0	96	12,7	87
Milieu de résidence								
Aire Métropolitaine	70,2	666	39,7	467	95,4	326	58,2	311
Autres Villes	54,8	530	31,8	290	95,3	292	49,0	278
Ensemble urbain	63,3	1 195	36,7	757	95,3	618	53,8	589
Rural	46,5	1 149	18,5	534	93,9	629	32,9	590
Département								
Aire Métropolitaine	70,2	666	39,7	467	95,4	326	58,2	311
Ouest (sans Aire Métro.)	52,4	421	24,7	221	98,3	198	42,0	195
Sud-Est	44,4	102	17,5	45	95,5	54	49,5	52
Nord	55,5	233	24,5	130	92,0	96	36,3	89
Nord-Est	34,0	66	31,4	22	90,7	36	46,9	32
Artibonite	49,1	337	18,5	165	91,0	208	28,1	190
Centre	32,8	153	13,7	50	89,6	70	41,6	63
Sud	47,6	123	32,5	59	98,3	101	39,6	99
Grande-Anse	61,3	77	34,3	47	96,3	49	43,1	47
Nord-Ouest	50,5	115	14,6	58	96,7	75	31,9	73
Nippes	52,9	51	32,6	27	89,6	32	45,6	29
Niveau d'instruction								
Aucun	31,7	207	11,8	66	78,5	54	(14,5)	42
Primaire/alphab.	47,9	1 039	18,5	498	93,9	503	28,9	472
Secondaire +	66,3	1 098	38,0	727	96,4	690	55,4	665
Quintile de bien-être économique								
Le plus pauvre	37,9	297	8,9	113	92,0	155	24,1	143
Second	43,8	333	13,8	146	92,5	207	23,7	192
Moyen	51,4	431	21,1	222	94,8	230	41,5	218
Quatrième	54,7	664	28,6	363	94,9	300	42,7	285
Le plus riche	72,4	618	43,7	448	96,6	354	64,0	342
Ensemble	55,1	2 344	29,2	1 291	94,6	1 247	43,3	1 179

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés

¹ Amis, famille et à la maison ne sont pas considérés comme source de condom


Le pourcentage de femmes de 15-24 ans ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal et non cohabitant est plus élevé parmi celles âgées de 15-19 ans (71 %), parmi celles qui ont déjà été en union (99 %), celles du milieu urbain (63 %), parmi celles de l'Aire Métropolitaine (70 %) et de la Grande-Anse (61 %), les plus instruites (66 %) et celles des ménages les plus aisés (72 %). On relève ici, que les catégories de jeunes femmes qui ont eu le plus fréquemment des rapports sexuels à hauts risques sont également celles qui ont été les plus grandes utilisatrices de condoms.

La proportion de jeunes hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête est nettement plus élevée que celle observée chez les femmes (95 % contre 55 %). Comme chez les femmes, il s'agit principalement des jeunes hommes de 15-19 ans (99 %) et de ceux qui ont déjà été en union (100 %). À l'opposé, c'est parmi ceux sans instruction (79 %) que cette proportion est la plus faible.

Le graphique 14.1 présente les proportions de jeunes femmes et de jeunes hommes selon la catégorie de risque de contracter le VIH/sida à laquelle ils sont exposés.

- les jeunes qui n'ont couru aucun risque de transmission du VIH par voie sexuelle puisqu'ils n'ont jamais eu de rapports sexuels. Ils représentent une proportion de 42 % chez les femmes et 25 % chez les hommes de 15-24 ans. Ces proportions sont plus importantes chez les plus jeunes que chez les plus âgés, tant pour les femmes (59 % à 15-19 ans contre 18% à 20-24 ans) que pour les hommes (37 % à 15-19 ans contre 9 % à 20-24 ans) ;
- les jeunes qui ont déjà eu des rapports sexuels mais qui n'ont pas couru de risque de transmission du VIH par voie sexuelle au cours de la période récente (12 derniers mois). Ce sont ceux qui, soit n'ont pas eu de rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, soit qui n'ont eu qu'un seul partenaire et qui ont utilisé un condom au cours de leurs derniers rapports sexuels. Ils représentent 18 % chez les femmes de 15-24 ans et 30 % des hommes du même groupe d'âges ;
- les jeunes qui ont couru le risque de contracter le VIH parce qu'ils ont adopté des comportements non sécuritaires (40 % chez les femmes contre 45 % chez les hommes). Ce sont ceux qui ont eu soit un seul partenaire mais n'ont pas utilisé de condoms lors des derniers rapports, soit qui ont utilisé un condom mais ont eu plusieurs partenaires, soit enfin, ceux qui ont eu des rapports avec plusieurs partenaires en utilisant un condom aux derniers rapports sexuels. Il va de soi que les jeunes de cette dernière sous-catégorie courent les risques les plus élevés de contracter le VIH/sida. On constate que ces comportements sont plus fréquents chez les jeunes hommes et les jeunes femmes de 20-24 ans que parmi les plus jeunes (respectivement, 56 % contre 37 % et 61 % contre 25 %).

Graphique 14.1 Abstinence, fidélité et utilisation du condom par les jeunes de 15-24 ans



EMMUS-IV 2005-2006

14.8 RAPPORTS SEXUELS PRÉNUPTIAUX ET UTILISATION DU CONDOM PARMIS LES CÉLIBATAIRES DE 15-24 ANS

Les jeunes célibataires constituent une population à risque dans la mesure où, à ces âges, les relations sexuelles sont généralement instables et le multipartenariat fréquent. Au cours de l'EMMUS-IV, il était donc important d'appréhender les types de comportement des jeunes enquêtés âgés de 15-24 ans en matière de prévention du VIH/sida. Le tableau 14.13 présente les proportions de jeunes célibataires de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 mois précédant l'enquête et ceux qui ont utilisé des condoms au cours des derniers rapports sexuels selon certaines caractéristiques sociodémographiques.

Dans l'ensemble, 25 % des jeunes femmes de 15-24 ans ont eu des rapports sexuels prénuptiaux au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Ce type de rapports est plus fréquent dans le groupe des 20-24 ans (41 %) que dans celui des 15-19 ans (20 %). De plus, les résultats montrent que 37 % des femmes ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels ; cette proportion ne présente aucun écart important en fonction de l'âge.

Un peu plus de la moitié des hommes célibataires de 15-24 ans (55 %) ont déclaré avoir eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois. Parmi eux, 42 % ont utilisé des condoms. Les rapports sexuels prénuptiaux sont plus fréquents chez les hommes célibataires âgés de 20-24 ans (71 %) que chez les plus jeunes de 15-19 ans (45 %). C'est aussi dans ce groupe d'âges que l'utilisation du condom a été la plus fréquente (51 %).

Quel que soit le sexe, l'utilisation du condom a été plus fréquente en milieu urbain qu'en milieu rural (46 % chez les femmes et (52 %) les hommes). Chez les femmes, étant donné la faiblesse des effectifs, les variations selon le département sont difficiles à interpréter. Chez les hommes, c'est dans l'Aire Métropolitaine que l'on note la proportion la plus élevée d'hommes ayant utilisé des condoms (57 %). Le niveau d'instruction et le quintile font apparaître des écarts : ce sont chez les femmes et les hommes les plus instruits et ceux du quintile le plus riche que l'utilisation du condom a été la plus élevée.

Tableau 14.13 Jeunes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels pré-nuptiaux au cours des 12 derniers mois et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels pré-nuptiaux

Parmi les jeunes célibataires de 15-24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête et, parmi ces derniers, pourcentage ayant utilisé des condoms au cours des derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Femmes					Hommes				
	N'a jamais eu de rapports sexuels	Ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	Effectif de célibataires de 15-24 ans	Ayant utilisé des condoms au cours des derniers rapports sexuels	Effectif de femmes de 15-24 ans sexuellement actives au cours des 12 derniers mois	N'a jamais eu de rapports sexuels	Ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	Effectif de célibataires de 15-24 ans	Ayant utilisé des condoms au cours des derniers rapports sexuels	Effectif d'hommes de 15-24 ans sexuellement actifs au cours des 12 derniers mois
Groupe d'âges										
15-17	80,8	14,0	1 490	38,2	209	46,5	37,9	769	29,3	291
18-19	58,0	31,3	689	37,4	216	22,0	58,8	415	37,3	244
20-22	47,1	40,4	550	37,0	222	12,4	70,9	504	51,2	357
23-24	39,4	43,4	250	32,8	108	9,1	71,7	211	50,7	151
15-19	73,6	19,5	2 180	37,8	425	37,9	45,2	1 183	32,9	535
20-24	44,7	41,3	799	35,7	330	11,4	71,1	715	51,1	509
Connait une source de condom¹										
Oui	62,5	28,0	2 277	39,5	638	21,9	60,2	1 597	44,2	962
Non	76,6	16,7	702	22,3	117	59,7	27,3	301	12,8	82
Milieu de résidence										
Aire Métropolitaine	60,1	28,7	810	53,4	232	17,3	62,4	415	57,0	259
Autres Villes	61,4	29,1	698	36,8	203	19,3	62,2	401	46,4	250
Ensemble urbain	60,7	28,9	1 508	45,6	435	18,3	62,3	816	51,8	509
Rural	71,1	21,7	1 471	24,9	320	35,2	49,5	1 082	32,3	535
Département										
Aire Métropolitaine	60,1	28,7	810	53,4	232	17,3	62,4	415	57,0	259
Ouest (sans Aire Métro.)	57,9	32,5	498	30,3	162	29,7	48,0	362	41,8	174
Sud-Est	74,9	20,7	141	(21,9)	29	40,0	43,6	102	45,9	44
Nord	59,5	29,6	318	30,0	94	36,3	49,8	153	37,3	76
Nord-Est	80,9	12,2	92	(45,2)	11	42,5	50,6	57	45,4	29
Artibonite	70,1	25,2	387	27,4	98	22,5	58,9	308	25,9	181
Centre	84,0	11,2	212	(20,0)	24	44,6	45,8	135	40,9	62
Sud	74,7	15,9	194	(30,5)	31	25,8	61,2	139	37,8	85
Grande-Anse	62,9	29,5	108	42,4	32	30,9	55,7	83	40,7	46
Nord-Ouest	68,8	19,2	164	22,0	31	23,7	63,2	101	31,5	64
Nippes	75,6	19,5	57	(38,6)	11	35,6	53,4	43	45,0	23
Niveau d'instruction										
Aucun	62,8	26,7	95	*	25	43,6	43,0	93	(15,3)	40
Primaire/alphab.	74,4	19,1	1 386	23,6	264	38,5	48,6	876	26,5	426
Secondaire +	58,1	31,0	1 498	44,9	465	16,4	62,2	929	54,9	578
Quintile de bien-être économique										
Le plus pauvre	78,9	13,8	347	15,7	48	45,5	47,3	280	25,4	132
Second	75,7	17,2	473	17,7	81	35,6	47,8	376	22,9	180
Moyen	68,2	24,4	523	26,9	128	34,0	51,8	360	41,9	186
Quatrième	61,5	28,0	668	37,1	187	17,4	57,8	416	41,1	240
Le plus riche	58,0	32,1	968	49,1	311	16,0	65,3	467	60,4	305
Ensemble	65,8	25,3	2 979	36,9	755	27,9	55,0	1 898	41,8	1 044

¹ Amis, famille et à la maison ne sont pas considérés comme source de condom

* Basé sur trop peu de cas non pondérés

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés

14.9 INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)

Les infections sexuellement transmissibles (IST) pouvant favoriser la transmission du virus du sida, la prévention et la lutte contre ces infections constituent une priorité. Au cours de l'enquête, on a demandé aux hommes et aux femmes enquêtés s'ils avaient eu une IST ou des symptômes associés à des IST et il a été possible d'établir une prévalence déclarée des IST. Enfin, certaines questions ont porté sur le comportement adopté en cas d'infection, en termes de conseil et de traitement.

14.9.2 Prévalence déclarée d'IST

Les résultats du tableau 14.14 montrent que 9 % des femmes et 3 % des hommes de 15-49 ans ont déclaré avoir eu une IST au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Il est fort probable que cette prévalence déclarée soit sous-estimée du fait que certaines personnes peuvent avoir des IST et ne pas le savoir ou ne pas reconnaître qu'il s'agit d'une IST, et aussi du fait que certaines personnes avouent difficilement avoir eu de telles maladies, surtout au cours d'une enquête. Quelle que soit la variable, chez les femmes cette prévalence déclarée est très faible : elle varie d'un minimum de 5 % dans les Nippes et le Centre à un maximum de 14 % dans le Nord et le Nord-Ouest.

Par ailleurs, on a essayé de déterminer si les enquêtés avaient présenté des symptômes d'IST au cours des 12 derniers mois : environ 20 % des femmes ont déclaré avoir eu des pertes vaginales anormales et 5 % ont déclaré avoir eu une plaie ou un ulcère génital. La prévalence totale déclarée d'IST (selon les déclarations spontanées et selon les symptômes) estimée ici à 21 % parmi les femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels, doit être prise comme un ordre de grandeur et non comme une estimation précise car la présence de ces différents symptômes ou signes ne sont pas toujours la preuve d'une IST. Néanmoins, les femmes des départements du Nord-Ouest (28 %), du Nord (27 %) et de l'Artibonite (26 %) seraient celles qui auraient eu le plus fréquemment des IST ou des symptômes révélateurs d'IST.

Une proportion d'hommes (3 %) quasiment beaucoup plus faible que celle des femmes (9 %) ont déclaré spontanément avoir eu une IST. De plus, 6 % ont déclaré avoir eu un écoulement du pénis et 3 % une plaie ou un ulcère génital. Globalement, d'après les déclarations spontanées et/ou les symptômes, 8 % des hommes auraient eu une IST au cours des 12 derniers mois. On constate que la prévalence des IST est plus élevée parmi ceux de 25-29 ans (12 %), parmi ceux des départements de l'Ouest (13 %) et de l'Artibonite (16 %).

Tableau 14.14 Infection sexuellement transmissible (IST) et symptômes d'IST déclarés

Parmi les femmes et les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels, pourcentage ayant déclaré avoir eu une IST et/ou des symptômes d'IST au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Caractéristique	Femmes					Hommes				
	Pourcentage avec une IST	Pourcentage avec pertes vaginales/anormales/malodorantes	Pourcentage avec une plaie/ulcère génital	Pourcentage avec IST/perte/plaie/ulcère	Effectif de femmes ayant déjà eu des rapports sexuels	Pourcentage avec une IST	Pourcentage avec des écoulements du pénis	Pourcentage avec une plaie/ulcère génital	Pourcentage avec IST/écoulement plaie/ulcère	Effectif d'hommes ayant déjà eu des rapports sexuels
Groupe d'âges										
15-19	8,4	17,5	3,9	19,4	1 097	1,0	5,8	3,8	8,3	762
20-24	10,9	23,2	5,5	24,4	1 646	2,2	6,8	3,0	8,4	811
25-29	11,1	23,0	4,9	24,1	1 663	5,7	7,7	4,5	11,8	581
30-39	9,3	18,5	4,3	19,5	2 366	3,2	6,5	2,1	8,2	962
40-49	6,9	17,0	4,5	18,0	1 857	1,0	4,4	1,7	5,5	762
15-24	9,9	21,0	4,8	22,4	2 743	1,6	6,3	3,4	8,3	1 573
État matrimonial										
Célibataire	8,3	18,0	3,2	19,5	1 327	2,3	6,4	3,6	8,8	1 766
En union	9,7	20,7	5,1	21,9	6 323	2,8	5,6	2,4	7,6	1 894
Divorcé/séparé/veuf	8,5	16,6	3,7	17,4	980	1,9	9,4	2,1	9,8	218
Milieu de résidence										
Aire Métropolitaine	9,4	16,3	4,2	17,5	2 213	2,2	3,3	1,3	4,4	944
Autres Villes	12,4	22,8	5,6	24,2	1 770	2,1	5,4	2,7	7,2	783
Ensemble urbain	10,7	19,2	4,8	20,5	3 983	2,1	4,2	2,0	5,6	1 727
Rural	8,2	20,4	4,5	21,5	4 646	2,8	7,8	3,7	10,4	2 152
Département										
Aire Métropolitaine	9,4	16,3	4,2	17,5	2 213	2,2	3,3	1,3	4,4	944
Ouest (sans Aire Métro.)	9,2	21,5	2,7	22,3	1 501	2,4	8,4	5,3	12,7	646
Sud-Est	6,6	15,2	3,2	16,5	373	1,9	3,9	0,8	3,9	185
Nord	14,0	25,8	7,8	27,3	836	3,1	5,7	1,5	6,6	327
Nord-Est	9,1	21,1	4,5	21,9	261	0,4	2,9	1,3	3,9	120
Artibonite	10,4	24,3	5,8	26,1	1 373	3,9	11,1	6,4	15,8	681
Centre	5,4	15,9	4,1	17,7	617	2,8	4,2	0,4	4,6	264
Sud	5,8	14,3	4,7	14,7	513	0,9	2,9	0,2	2,9	261
Grande-Anse	5,5	13,5	3,0	14,7	285	2,1	6,5	3,3	8,0	153
Nord-Ouest	13,7	27,5	7,3	28,1	470	2,7	8,6	3,0	9,9	206
Nippes	5,2	13,7	3,2	14,6	188	1,5	3,6	2,1	4,4	92
Niveau d'instruction										
Aucun	7,6	16,9	4,7	18,2	2 095	2,1	5,9	2,1	8,1	518
Primaire/alphab.	8,7	20,9	4,5	21,8	3 493	1,6	6,4	3,1	8,4	1 506
Secondaire +	11,3	20,6	4,8	22,0	3 042	3,3	6,1	3,0	8,2	1 855
Quintile de bien-être économique										
Le plus pauvre	6,8	17,6	4,9	19,1	1 369	2,2	4,8	1,2	6,1	578
Second	7,3	20,9	4,9	21,8	1 388	2,4	8,0	3,7	10,4	698
Moyen	8,8	19,0	4,6	20,3	1 615	3,6	7,9	3,8	9,9	708
Quatrième	11,8	22,2	4,6	23,3	2 093	1,7	5,5	2,4	7,4	866
Le plus riche	10,3	18,8	4,3	20,0	2 164	2,6	5,1	3,2	7,7	1 029
Ensemble 15-49	9,3	19,8	4,6	21,0	8 629	2,5	6,2	2,9	8,3	3 879
Ensemble hommes 15-59	na	na	na	na	na	2,3	5,7	2,7	7,6	4 395

na = Non applicable

14.9.2 IST et comportement

Parmi les femmes ayant déclaré avoir eu une IST et/ou des symptômes associés aux IST au cours des 12 derniers mois, on constate qu'une sur deux n'a demandé aucun conseil (50 %) ; dans 40 % des cas, les femmes se sont adressées à un professionnel de santé pour obtenir des conseils (tableau 14.15). Plus de deux hommes sur cinq (45 %) n'ont pas recherché de conseils. À l'opposé, 33 % se sont rendus auprès d'un professionnel de santé pour en obtenir. On constate aussi que dans 22 % des cas, les hommes ont demandé conseil à des amis/parents alors que chez les femmes, cette proportion est nulle.

En ce qui concerne la recherche de traitement, on constate en premier lieu qu'environ un tiers des femmes et des hommes n'ont pris aucune mesure (respectivement, 34 % et 30 %). Plus de la moitié des femmes (54 %) et une proportion plus faible d'hommes (43 %) se sont orientés vers une structure sanitaire ou un professionnel de santé pour recevoir des soins. En outre, près d'un quart des hommes (24 %) ont recherché un traitement auprès de parents et d'amis. Dans 14 % des cas contre 9 % chez les femmes, les hommes se sont rendus dans une boutique/pharmacie pour se procurer les médicaments nécessaires au traitement.

Tableau 14.15 Recherche de conseils et/ou de traitement pour les IST

Parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans ayant déclaré avoir eu une IST ou des symptômes d'IST au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui ont recherché des conseils et/ou un traitement, selon la source du conseil ou du traitement, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

Source du conseil ou du traitement	Femmes	Hommes
Conseils		
Clinique/hôpital/professionnel de santé	39,9	33,1
Guérisseur traditionnel	0,0	0,8
Boutique/pharmacie	5,9	5,2
Amis/parents	0,0	22,4
N'importe quelle autre source	4,2	0,6
Pas de conseils	50,1	45,2
Traitement		
Clinique/hôpital/professionnel de santé	54,2	42,9
Guérisseur traditionnel	0,0	1,4
Boutique/pharmacie	8,9	14,3
Amis/parents	0,0	23,8
N'importe quelle autre source	2,9	0,0
Pas de traitement	34,3	29,7
Effectif avec une IST et/ou des symptômes d'IST	1 812	321

14.10 PREVALENCE DES INJECTIONS

Des injections faites sans respect des normes d'asepsie peuvent être source de contamination. Il est donc important de savoir si la population reçoit ou non les services d'injection des agents de santé effectués selon les normes recommandées.

Le tableau 14.16 montre que dans l'ensemble, 20 % des femmes et 12 % des hommes ont eu une injection médicale effectuée par un agent de santé au cours des douze mois ayant précédé l'enquête.

On constate que les femmes de 25-39 ans ont plus fréquemment reçu des injections que les autres (au moins 26 % contre 13 % à 15-19 ans). La prévalence des injections est également plus élevée dans l'Artibonite (29 % contre un minimum de 15 % dans le Sud-Est). Chez les hommes, c'est dans l'Artibonite et dans le Centre (17 % dans les deux cas) que cette prévalence est la plus élevée. À l'opposé, dans la Grande Anse, elle n'est que de 8 %. En moyenne, les hommes et les femmes ont reçu, respectivement, 0,7 et 0,4 injections médicales au cours des 12 derniers mois.

En outre, dans la quasi-totalité des cas (99 % pour les femmes et 96 % pour les hommes), la dernière injection a été faite avec une seringue et une aiguille prises d'un emballage neuf et qui n'était pas ouvert au moment de la piqûre. Cependant, il faut souligner que dans le Nord, la proportion d'hommes ayant reçu des injections avec du matériel qui était neuf est plus faible qu'ailleurs (87 %).

Tableau 14.16 Prévalence des injections


Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont reçu au moins une injection effectuée par du personnel médical au cours des 12 derniers mois, nombre moyen d'injections effectuées par du personnel médical au cours des 12 derniers mois et, parmi ceux qui ont reçu une injection effectuée par du personnel médical, pourcentage pour lesquels la personne qui a effectué la piqûre a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf et qui n'était pas ouvert, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV, Haïti 2005-2006

Caractéristique	Femmes					Hommes				
	Pourcentage ayant reçu une injection effectuée par du personnel médical au cours des 12 derniers mois	Nombre moyen d'injections effectuées par du personnel médical au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	La dernière fois, la seringue et l'aiguille ont été prises d'un emballage neuf et qui n'était pas ouvert	Effectif de femmes ayant reçu une injection effectuée par du personnel médical au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant reçu une injection effectuée par du personnel médical au cours des 12 derniers mois	Nombre moyen d'injections effectuées par du personnel médical au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes	La dernière fois, la seringue et l'aiguille ont été prises d'un emballage neuf et qui n'était pas ouvert	Effectif d'hommes ayant reçu une injection effectuée par du personnel médical au cours des 12 derniers mois
Groupe d'âges										
15-24	16,3	0,5	4 704	99,4	769	11,0	0,3	2 104	95,9	231
..15-19	13,2	0,3	2 701	99,2	356	8,8	0,2	1 211	93,5	107
..20-24	20,6	0,6	2 004	99,6	413	14,0	0,5	893	98,0	125
25-29	29,2	0,9	1 761	99,6	513	13,7	0,4	597	97,7	82
30-39	25,8	0,9	2 412	98,4	622	12,2	0,4	969	96,6	118
40-49	14,5	0,6	1 879	98,9	273	13,5	0,6	768	91,5	104
Milieu de résidence										
Aire Métropolitaine	15,7	0,6	2 773	99,6	436	9,3	0,4	1 016	97,6	94
Autres Villes	24,6	0,9	2 232	98,7	549	13,2	0,5	865	94,3	114
Ensemble Urbain	19,7	0,7	5 005	99,1	986	11,1	0,4	1 881	95,8	208
Rural	20,7	0,6	5 752	99,1	1 191	12,7	0,4	2 556	95,3	326
Département										
Aire Métropolitaine Ouest(sans Aire Métro.)	15,7	0,6	2 773	99,6	436	9,3	0,4	1 016	97,6	94
Sud-Est	15,3	0,4	487	99,6	75	10,0	0,4	227	94,2	23
Nord	21,5	0,7	1 036	99,7	223	10,8	0,5	385	86,5	42
Nord-Est	19,7	0,6	339	98,4	67	10,6	0,3	146	98,3	16
Artibonite	28,9	0,9	1 654	98,7	477	17,2	0,4	754	97,7	130
Centre	24,0	0,7	811	98,3	194	17,4	0,5	331	97,8	58
Sud	16,1	0,5	669	99,4	107	9,9	0,3	299	96,4	30
Grande-Anse	16,5	0,4	355	97,0	59	7,5	0,1	179	94,0	13
Nord-Ouest	23,1	0,8	593	99,7	137	10,4	0,4	233	91,5	24
Nippes	20,2	0,5	232	98,1	47	9,4	0,3	109	100,0	10
Niveau d'instruction										
Aucune instruction	18,4	0,5	2 169	98,3	399	8,7	0,3	566	91,3	49
Primaire/alphab.	20,9	0,6	4 553	99,2	952	11,9	0,4	1 860	93,8	222
Secondaire +	20,5	0,8	4 034	99,3	826	13,1	0,5	2 012	97,7	263
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	17,1	0,4	1 656	98,5	284	10,5	0,3	719	98,1	76
Second	18,8	0,5	1 762	98,8	332	12,4	0,3	839	94,6	104
Moyen	24,2	0,6	1 985	98,9	481	14,4	0,4	831	91,6	120
Quatrième	21,8	0,7	2 539	99,6	555	9,4	0,5	943	96,0	89
Le plus riche	18,7	0,8	2 814	99,3	525	13,2	0,4	1 105	97,6	146
Total 15-49	20,2	0,7	10 757	99,1	2 177	12,0	0,4	4 438	95,5	534

Note : Les injections médicales sont celles qui sont effectuées par un médecin, une infirmière, un dentiste ou un autre professionnel de santé
na = Non applicable

Le graphique 14.2 présente les résultats concernant les proportions de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont reçu une injection médicale effectuée par du personnel de santé au cours des douze derniers mois précédant l'enquête selon la source de la dernière injection. C'est au secteur médical privé qu'une proportion élevée de femmes et d'hommes (45 % et 40 %) se sont adressés pour recevoir la dernière injection : plus précisément, dans 20 % des cas chez les femmes, c'est une infirmière/auxiliaire qui a effectué l'injection ; par contre, les hommes se sont rendus plus fréquemment dans un hôpital, une clinique ou chez un médecin (25 % contre 10 % chez les femmes). En outre, dans environ un quart des cas, les femmes (25 %) et les hommes (26 %) se sont adressés au secteur public pour y recevoir leur dernière injection. Les données représentées au graphique 14.3 montrent aussi que dans 15 % des cas pour les femmes et 20 % pour les hommes, la dernière injection a été effectuée par un agent du secteur non gouvernemental, essentiellement, un agent de santé d'une ONG.


Graphique 14.2 Lieu de la dernière injection effectuée par du personnel médical



EMMUS-IV 2005-2006

On constate au graphique 14.3 que quel que soit le type de prestataire et de secteur médical, la quasi-totalité des femmes et des hommes ont déclaré que les injections qu'ils avaient reçues au cours des 12 derniers mois avaient été effectuées dans le respect de certaines normes d'asepsie, c'est-à-dire que l'aiguille et la seringue provenaient d'un emballage neuf et non ouvert.

Graphique 14.3 Injection sans risque selon le lieu de la dernière injection
(seringue et aiguille provenant d'un emballage neuf et non ouvert)



EMMUS-IV 2005-2006